



hbsc
ITALIA/ITALY



Segreteria di Stato per la Sanità
Segreteria di Stato per l'Istruzione
Authority Sanitaria
Istituto Sicurezza Sociale

HBSC

*Stili di vita e salute
dei giovani
sammarinesi
tra 11 e 15 anni*

San Marino



<i>PREFAZIONE</i>	7
<i>PREMESSA</i>	9
<i>RINGRAZIAMENTI</i>	10
1. LO STUDIO HBSC ITALIA 2018 E IL CAMPIONE REGIONALE	11
INTRODUZIONE	12
METODOLOGIA	12
POPOLAZIONE IN STUDIO	12
MODALITA' DI CAMPIONAMENTO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
QUESTIONARI PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E PROCEDURE DI ANALISI.....	12
VALUTAZIONE DEL COMITATO ETICO DELL'ISS E PRIVACY	13
DESCRIZIONE DEL CAMPIONE REGIONALE.....	13
2. IL CONTESTO FAMILIARE	16
LA FAMIGLIA.....	17
INTRODUZIONE	17
LA STRUTTURA FAMILIARE.....	17
LA QUALITA' DELLE RELAZIONI CON I GENITORI.....	18
LO STATUS SOCIO-ECONOMICO FAMILIARE	20
CONCLUSIONI [a cura della Regione]	22
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE	23
3. L'AMBIENTE SCOLASTICO	24
INTRODUZIONE	25
STRUTTURA SCOLASTICA, ORGANIZZAZIONE INTERNA E PROMOZIONE DEL BENESSERE	25
RAPPORTO CON GLI INSEGNANTI	28
RAPPORTO CON I COMPAGNI DI CLASSE	30
BULLISMO E CYBERBULLISMO.....	32
LA SCUOLA.....	36
CONCLUSIONI [a cura della Regione]	38
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE	38
4. SPORT E TEMPO LIBERO	40
INTRODUZIONE	41
L'ATTIVITA' FISICA	41
COMPORAMENTI SEDENTARI	43
FREQUENZA DELL'USO DI TELEVISIONE, COMPUTER E NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE.....	44
CONCLUSIONI [a cura della Regione]	47

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE	47
5. ABITUDINI ALIMENTARI E STATO NUTRIZIONALE	49
INTRODUZIONE	50
FREQUENZA E REGOLARITA' DEI PASTI	51
CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA	52
CONSUMO DI DOLCI E BEVANDE GASSATE.....	54
STATO NUTRIZIONALE	56
INSODDISFAZIONE CORPOREA.....	57
IGIENE ORALE	59
CONCLUSIONI [cura della Regione].....	60
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE	60
6. COMPORTAMENTI DI DIPENDENZA	62
INTRODUZIONE	63
USO DI SOSTANZE	63
FUMO	64
ALCOL	65
CANNABIS.....	69
GIOCO D'AZZARDO.....	69
CONCLUSIONI [a cura della Regione]	71
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE	72
7. SALUTE E BENESSERE	74
INTRODUZIONE	75
SALUTE PERCEPITA	76
BENESSERE PERCEPITO.....	77
SINTOMI RIPORTATI	78
UTILIZZO DI FARMACI.....	80
ABITUDINI SESSUALI.....	80
INFORTUNI	81
RAPPORTO TRA PARI.....	82
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE	83
8. I SOCIAL MEDIA	85
INTRODUZIONE	86
L'USO DEI SOCIAL MEDIA	86
CONCLUSIONI [a cura della Regione].....	89
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE	91

Il Gruppo di Ricerca HBSC Italia 2018

Istituto Superiore di Sanità: Paola Nardone, Angela Spinelli, Serena Donati, Daniela Pierannunzio, Enrica Pizzi, Silvia Andreozzi, Mauro Bucciarelli, Barbara De Mei, Chiara Cattaneo

Università degli studi di Torino: Franco Cavallo, Nazario Cappello, Giulia Piraccini, Paola Berchiolla, Alberto Borraccino, Lorena Charrier, Paola Dalmasso, Patrizia Lemma, Veronica Sciannameo

Università degli studi di Padova: Alessio Vieno, Natale Canale, Marta Gaboardi, Michela Lenzi, Claudia Marino, Massimo Santinello

Università degli studi di Siena: Giacomo Lazzeri, Mariano Vincenzo Giacchi, Andrea Pammolli, Rita Simi

Ministero della Salute: Daniela Galeone, Maria Teresa Menzano

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Alessandro Vienna

Referenti regionali: Claudia Colleluori, Manuela Di Giacomo, Ercole Ranalli (Regione Abruzzo), Gabriella Cauzillo, Mariangela Mininni, Gerardina Sorrentino (Regione Basilicata), Caterina Azzarito, Antonella Cernuzio, Marina La Rocca, Adalgisa Pugliese (Regione Calabria), Gianfranco Mazzarella (Regione Campania), Paola Angelini e Marina Fridel (Regione Emilia Romagna), Claudia Carletti, Federica Concina, Luca Ronfani, Paola Pani (Regione Friuli Venezia Giulia), Giulia Cairella, Laura Bosca, Maria Teresa Pancallo (Regione Lazio), Giannaelisa Ferrando (Regione Liguria), Corrado Celata, Liliana Coppola, Claudia Lobascio, Giuseppina Gelmi, Lucia Crottogini, Veronica Velasco (Regione Lombardia), Simona De Introna, Giordano Giostra (Regione Marche), Maria Letizia Ciallella, Michele Colitti, Ermanno Paolitto (Regione Molise), Marcello Caputo (Regione Piemonte), Domenico Stingi, Pina Pacella, Pietro Pasquale (Regione Puglia), Maria Antonietta Palmas, Alessandra Murgia (Regione Sardegna), Achille Cernigliaro, Maria Paola Ferro, Salvatore Scondotto (Regione Sicilia), Laura Aramini, Valentina Corridori, Giacomo Lazzeri (Regione Toscana), Marco Cristofori, Daniela Sorbelli, Giovanni Giovannini (Regione Umbria), Anna Maria Covarino (Regione Valle D'Aosta), Federica Michieletto, Erica Bino (Regione Veneto), Maria Grazia Zuccali (Provincia Autonoma di Trento), Antonio Fanolla, Sabine Weiss (Provincia Autonoma di Bolzano).

Il Gruppo di Ricerca San Marino HBSC 2018

Authority Sanitaria: Gabriele Rinaldi Referente HBSC per San Marino Elena Sacchini Coordinamento Progetto, Federico Tirabassi, Alessandra Melini.

Personale Iss che ha svolto la rilevazione nelle scuole: Clarissa Capella, Sabrina Piantamore, Martina Molari, Sara Pagliarani Cristina Guerra, Fanny Gasperoni, Rita Mularoni, Luigi Maria Pierulli, Claudia Moroni, Maria Rosa Chezzi.

PREFAZIONE

L'adolescenza rappresenta un momento importante per il passaggio alla vita adulta ed è caratterizzata da numerosi cambiamenti fisici, psicologici relazionali e sociali. Proprio in questo periodo possono instaurarsi stili di vita e comportamenti che condizionano la salute presente e futura come abitudini alimentari scorrette, sedentarietà, abuso di alcol, consumo di tabacco, uso di sostanze stupefacenti.

Lo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare) si inserisce in questo contesto con lo scopo di fotografare e monitorare la salute degli adolescenti sammarinesi di 11, 13 e 15 anni che frequentano le scuole di San Marino e costituire un supporto per l'orientamento delle politiche di educazione e promozione della salute in questa fascia di età.

HBSC è uno studio multicentrico internazionale svolto in collaborazione con l'Ufficio Regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa e prevede indagini campionarie su scala nazionale ogni 4 anni.

Lo studio è stato promosso da Inghilterra, Finlandia e Norvegia nel 1982 e oggi il Network HBSC comprende 49 paesi in Europa, Nord America e Israele e un vasto team multidisciplinare di studiosi e ricercatori.

San Marino ha già realizzato questa indagine di sorveglianza negli anni 2010, 2014 2018 con il supporto della segreteria di stato e dell'Università di Torino.

Le indagini di sorveglianza, che vengono ripetute periodicamente, sono state dichiarate importanti strumenti di programmazione sanitaria anche per i piani sanitari e i documenti di programmazione. Il piano sanitario e socio-sanitario della Repubblica di San Marino 2015-2017 pur conservando tutta la sua validità essendo stato elaborato in collaborazione con OMS è in fase di revisione e aggiornamento.

Ogni capitolo di questo rapporto presenta e analizza i dati relativi all'ambito studiato tra cui il contesto familiare e scolastico, le abitudini alimentari e i comportamenti a rischio, cercando di delineare un quadro puntuale della situazione nel territorio in osservazione.

Il nostro augurio è che questa attività di monitoraggio, proseguendo nel tempo, permetta di verificare i mutamenti, positivi o negativi, dei fenomeni osservati in rapporto alle politiche di intervento messe in atto.

Un ringraziamento va alla Segreteria di stato Sanità e alla Segreteria di Stato Istruzione e al Tavolo Multidisciplinare Scuola – Salute.

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno reso possibile la buona riuscita dell'indagine: i referenti, gli operatori sanitari, i dirigenti scolastici e gli insegnanti di tutti gli istituti coinvolti. Un ringraziamento particolare va ai ragazzi che, con la loro preziosa collaborazione nel compilare i questionari, hanno reso tutto questo possibile.

PREMESSA

La Segreteria di Stato Sanità in collaborazione con la Segreteria di Stato all'Istruzione ha avviato interventi che coinvolgono i Servizi ISS e gli Istituti scolastici, finalizzati alla promozione della salute, di sani stili di vita e per il contrasto delle patologie croniche.

L'indagine HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare), nata come studio internazionale coordinato in Italia dall'Università degli studi di Torino, si è progressivamente affermata a livello nazionale e regionale come lo strumento di sorveglianza dei comportamenti nell'età pre-adolescenziale e adolescenziale. HBSC integra e completa gli altri sistemi di sorveglianza nazionali, OKkio alla Salute, che si occupa della fascia d'età infantile, fondamentale per la definizione, attuazione e monitoraggio del Piano Sanitario e Socio Sanitario.

Il report che viene presentato si riferisce all'indagine attuata nel 2018, la terza a San Marino dopo quelle svolte nel 2010 e 2014. Anche questa edizione è stata caratterizzata da un'ottima collaborazione con l'ISS e gli Istituti scolastici. Particolare rilevanza assumono le attività del Tavolo multidisciplinare ed intersettoriale per la programmazione e il coordinamento degli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole. Tale Tavolo è stato costituito proprio con lo scopo di rafforzare l'alleanza tra Sanità e Scuola per individuare i bisogni e predisporre un efficiente piano operativo unitario per tutte le iniziative e le proposte relative alla promozione ed educazione alla salute in ambito scolastico compatibile con la programmazione socio sanitaria nazionale e con i programmi didattici nelle scuole.

Le informazioni presenti in questo report sono tante e ci consentono di avere un quadro aggiornato dei principali fattori comportamentali che possono promuovere o compromettere la salute attuale e futura degli adolescenti. Poiché, com'è noto, molti comportamenti dell'età adulta si strutturano in questa età, è necessario definire e consolidare programmi e politiche efficaci per promuovere fin dall'adolescenza comportamenti positivi per la salute ed in questa direzione sono indirizzate molte azioni contenute nel Piano Sanitario e Sociosanitario.

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano i Docenti e i Dirigenti scolastici che hanno contribuito alla realizzazione dello studio.

Si ringraziano tutte le scuole di San Marino, di seguito riportate, che hanno partecipato allo studio HBSC Italia 2018.

Scuole Medie Fonte dell'Ovo

Scuole Medie Serravalle

Liceo Classico San Marino

Liceo Scientifico San Marino

Liceo Economico

Liceo Linguistico

Istituto Tecnico Industriale

Centro Formazione Professionale

Si ringraziano infine tutti gli studenti che hanno partecipato all'indagine.

1. LO STUDIO HBSC ITALIA 2018 E IL CAMPIONE REGIONALE

INTRODUZIONE

“For a safer and more secure future,
we must pay much more urgent attention to the hopes
and needs of young people
and adolescents”

[Kleinert S. et al.; Lancet. 2016¹]

L'adolescenza rappresenta un periodo di grandi cambiamenti e sfide che richiede un'attenzione particolare in quanto in questa fase di vita, comunemente definita di transizione, si consolidano comportamenti che possono persistere in età adulta e compromettere o garantire lo stato di salute delle generazioni future. Investire nella salute dei giovani oggi, rappresenta dunque un guadagno in salute domani.

Proprio in quest'ottica si inserisce l'HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare) con lo scopo di descrivere e comprendere fenomeni e comportamenti correlati con la salute nella popolazione pre-adolescente e adolescente.

La rigidità del protocollo di indagine, cui tutti i Paesi partecipanti al network HBSC devono attenersi, consente la confrontabilità dei dati raccolti a livello internazionale e nazionale e garantisce la costruzione di indicatori di salute solidi utili anche per monitorare l'efficacia di eventuali azioni e interventi di promozione della salute intrapresi.

In questo capitolo è descritta la popolazione in studio e in dettaglio la procedura di campionamento che ha coinvolto tutte le regioni italiane.

METODOLOGIA

POPOLAZIONE IN STUDIO DI SAN MARINO

La popolazione in studio è costituita dai ragazzi di 11, 13 e 15 anni che frequentano rispettivamente le prime e le terze classi delle scuole secondarie di I grado e le classi seconde delle scuole secondarie di II grado della Repubblica di San Marino. Sono stati intervistati la totalità dei ragazzi interessati, quindi la rilevazione è universale. Le scuole di fatto sono il setting ideale per la raccolta dei dati sia in termini operativi che in vista di possibili interventi di comunità.

QUESTIONARI PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E PROCEDURE DI ANALISI

Le informazioni sono state raccolte attraverso due questionari: uno per i ragazzi e uno per il dirigente scolastico (quest'ultimo opzionale). Entrambi i questionari sono stati elaborati da un gruppo di ricerca multidisciplinare e internazionale; contengono una parte “core” comune a tutti i Paesi partecipanti e una parte “opzionale” con domande inserite su iniziativa del gruppo nazionale di coordinamento.

Il questionario rivolto ai ragazzi ha la finalità di indagare aspetti sulla salute nella sua accezione più ampia di benessere fisico, psicologico, relazionale e sociale e comprende le seguenti sezioni:

- dati anagrafici (età, sesso, Paese di nascita, ecc.);

- classe sociale (occupazione e livello di istruzione dei genitori);
- indicatori di benessere percepito (stato di salute e di benessere);
- autostima (valutazione del proprio aspetto fisico e del grado di accettazione di sé);
- rete di sostegno socio-affettivo (rapporto con i genitori, i coetanei, l'ambiente scolastico);
- comportamenti collegati alla salute (attività fisica e tempo libero, abitudini alimentari e igiene orale, abitudini sessuali, consumo di alcol e tabacco, gioco d'azzardo, consumo di cannabis, bullismo e cyberbullismo);
- uso di Internet e social network.

Le sezioni riguardanti il consumo di cannabis e le abitudini sessuali sono presenti solo nei questionari per i quindicenni.

Il questionario rivolto al dirigente scolastico, somministrato contestualmente alla raccolta dati rivolta ai ragazzi, indaga alcune dimensioni relative ad aspetti della scuola, nello specifico:

- caratteristiche strutturali e risorse della scuola;
- misure di promozione della salute adottate;
- informazioni sul quartiere in cui è situata la scuola.

Entrambi i questionari sono anonimi e vengono autocompilati dai ragazzi e dai dirigenti scolastici a scuola e con il sostegno degli insegnanti che hanno ricevuto informazioni opportune sulle procedure da seguire da parte del personale delle Asl.

Le risposte ai questionari vengono acquisite mediante la lettura ottica da parte di una ditta incaricata del lavoro a livello nazionale.

La costruzione del database, la pulizia dei record e la successiva analisi dei dati è stata realizzata a livello centrale dal gruppo di coordinamento dell'ISS e delle tre Università.

PRIVACY

I genitori dei ragazzi delle classi campionate ricevono prima della rilevazione una nota informativa della regione con la descrizione delle finalità della Sorveglianza. Le famiglie possono rifiutare la partecipazione del proprio figlio attraverso l'informativa che deve essere comunque restituita, firmata dai genitori, agli insegnanti della classe coinvolta.

Non vengono rilevati dati identificativi dei singoli individui che partecipano all'indagine sia perché la sorveglianza è interessata a dati di popolazione sia per rispetto della normativa sulla privacy.

Il questionario essendo anonimo rispetta la normativa sammarinese sul trattamento dei dati

DESCRIZIONE DELLA POPOLAZIONE INTERVISTATA

A San Marino sono state intervistate 34 classi per la scuola secondaria di I grado (Classe I e III) e 9 classi di per la scuola secondario di II grado (Classe II), per un totale di 43 classi. Non è stato possibile intervistare per motivi organizzativi gli studenti della scuola secondaria di secondo grado che frequentano le scuole italiane (questi ragazzi rappresentano circa il 50% della coorte dei 15 enni).

Hanno restituito i questionari compilati che ammontano a 738 tutte le classi interpellate con una rispondenza complessiva del 100% (tabella 1.1). Il tasso di

rispondenza degli intervistati è risultato, come nelle precedenti indagini molto alto pari al 93%. La buona partecipazione delle classi, oltre a garantire la rappresentatività del mondo adolescenziale sammarinese, conferma l'efficacia delle fasi preparatorie dell'indagine e la positiva sinergia tra il settore scolastico e quello della salute che si attua prevalentemente nel Tavolo Salute Scuola.

Tabella 1.1 Rispondenza per classe (%)

	Classi intervistate	N° di classi che hanno compilato il questionario	Percentuale di rispondenza (%)
Classe I Media	17	17	100
Classe III Media	17	17	100
Classe II Superiore	9	9	100
Totale	43	43	100


L'universo degli studenti nelle scuole sammarinesi intervistato era costituito da un totale di 738 studenti di cui: il 40.7% di 11 anni, il 38.3% di 13 anni ed il 21% di 15 anni (tabella 1.2)

Tabella 1.2 Composizione, per età e genere (%)

	Maschi	Femmine
11 anni	39,7	41,8
13 anni	34,2	43,3
15 anni	26,1	14,9
Totale	100	100

Considerando il paese di nascita degli intervistati la maggioranza (78,5%) sono nati a San Marino, il 19,4% in Italia e solo il 2,2% all'estero. (figura 1). Secondo la ripartizione per età il 77,7% degli 11 enni sono nati a San Marino, così come il 77% dei 13 enni e l'82,6% dei 15 enni, Nella figura 1 sono invece riportate le % degli intervistati nati in Italia e all'estero (extra Italia).

Figura 1. Composizione Paese di nascita – Italia vs Estero, per età (%)



Nella tabella seguente viene riportata la “% dei genitori per Paese di nascita”

Tabella 1.3 Composizione del campione dei genitori dei ragazzi ed età per nascita a San Marino, in Italia e all'estero (%)

	%
Entrambi i genitori nati a San Marino	17,6
Un genitore a San Marino e uno in Italia	38,2
Un genitore a San Marino e uno all'estero (escluso Italia)	7,6
Entrambi i genitori Italiani	20,5
Un genitore italiano e uno all'estero (escluso Italia)	8,4
Entrambi i genitori nati all'estero (escluso Italia)	7,7

Nella maggioranza degli adolescenti entrambi i genitori hanno nazionalità sammarinese/ italiana, infatti solo nel 23,7% dei casi gli adolescenti dichiarano di avere un genitore o entrambi di altra nazionalità estera esclusa l'Italia.

2. IL CONTESTO FAMILIARE

LA FAMIGLIA

INTRODUZIONE

L'adolescenza è un processo evolutivo che coinvolge non solo i ragazzi, ma l'intera famiglia.

Le trasformazioni che interessano i ragazzi sul piano psico-fisico si accompagnano anche a un cambiamento delle relazioni familiari e amicali^{1,2}.

La famiglia, insieme alla scuola e al mondo dei pari, è l'ambito nel quale gli adolescenti iniziano a costruire la propria identità personale e il proprio ruolo sociale. Attraverso la ridefinizione dei rapporti con i genitori e, contemporaneamente, ad un più intenso investimento nelle relazioni amicali, avviano una progressiva acquisizione di autonomia con precue componenti affettive, ideative e sociali³.

In questo capitolo si approfondisce il ruolo della struttura familiare e della relazione genitori-figli che, insieme al livello socio-economico della famiglia, definiscono il contesto di vita, e la percezione che i ragazzi hanno di essa, aspetti questi in grado di influenzare il benessere e i comportamenti di salute nel loro complesso.

LA STRUTTURA FAMILIARE

La struttura familiare negli ultimi anni, seguendo le trasformazioni della società, è diventata sempre più complessa e ha subito un processo di diversificazione. Anche se a San Marino questo processo che ha visto crescere nuove strutture familiari è cominciato più tardi rispetto ad altri paesi europei, la cosiddetta famiglia tradizionale non è più la sola opzione anche se rappresenta il 77% nella rilevazione eseguita. Infatti è ormai possibile imbattersi in famiglie mono-genitoriali, o famiglie in cui i genitori abbiano divorziato e convivano con un altro partner o si siano in seguito risposati.

In termini di cambiamenti della struttura familiare si possono annoverare la diminuzione della numerosità dei componenti della famiglia, l'aumento delle famiglie monogenitoriali (single), la presenza delle famiglie allargate o estese (con nonni o altri parenti) che un tempo erano una risorsa mentre oggi nascono dalle necessità, spesso di salute, dei componenti più anziani e infine la crescita di nuove tipologie familiari: in particolare le famiglie mono-genitoriali e le famiglie ricostituite⁴.

Questi cambiamenti, che si intrecciano con le relazioni interpersonali, hanno un forte impatto sullo sviluppo psico-fisico dei ragazzi sia nella fase dell'infanzia che in quella dell'adolescenza⁵. Studiare la famiglia nei suoi diversi aspetti, strutturali e relazionali, diventa quindi quanto mai attuale.

E' stata osservata una forte associazione tra basso livello socio-economico e salute psichica dei bambini⁶, e come l'instabilità familiare in generale sia strettamente legata con lo sviluppo dei rapporti sociali dei ragazzi⁷.

Diversi autori hanno però messo in discussione queste relazioni, sostenendo che lo svantaggio diventa reale soltanto quando a questa condizione se ne uniscono altre, come l'isolamento dal contesto sociale e dalle altre famiglie, oppure uno stato di conflittualità permanente o l'esistenza di problemi economici^{8,9}.

Non è tuttavia ancora chiaro se questo tipo di associazioni causali si riscontrino anche tra gli adolescenti.

Il presente studio indaga la struttura familiare chiedendo ai giovani di indicare con quali persone vivono per la maggior parte del tempo (genitori, genitori acquisiti,

nonni, altri adulti, altro). Dalle risposte sono state ricavate le principali tipologie di struttura familiare (tabella 2.1)

Le coppie con figli rappresentano la tipologia quantitativamente più rilevante; le famiglie monogenitori rappresentano il 14,6% dei nuclei familiari di cui il 12,4% composti da donne. Nel 6,9% dei casi i ragazzi vivono all'interno di famiglie "ricostituite" che possono essere più o meno complesse e appaiono caratterizzate da una certa fragilità. Solo nell'1,1% dei casi i ragazzi hanno indicato di non vivere con i genitori ma in altra sistemazione senza genitori o nonni.

Tabella 2.1 Tipologia di famiglia (%)

	%
Madre e padre (no altri adulti)	77,4
Solo madre	12,4
Solo padre	2,2
Famiglia ricostituita (padre o madre biologici più nuovo coniuge)	6,9
Altra sistemazione senza genitori o parenti/nonni	1,1
Totale	100

Come si evince dalla tabella 2.2, Più della metà del campione (60,2%) ha un solo fratello o sorella, mentre solo 1 ragazzo su 5 ha 2 o più fratelli. I figli unici sono rappresentati dal 17,4%.

Tabella 2.2 Fratelli e sorelle (%)

	%
Figli unici	17,4
1 fratello o sorella	60,2
2 o più fratelli o sorelle	22,4
Totale	100

LA QUALITÀ DELLE RELAZIONI CON I GENITORI

La natura e la qualità delle relazioni che i ragazzi instaurano con i genitori, durante l'adolescenza, influiscono in misura rilevante sui loro comportamenti di salute e sul benessere percepito. Molti studi hanno dimostrato che la comunicazione familiare è un indicatore della capacità dei genitori di aiutare i loro figli adolescenti ad affrontare positivamente le difficoltà che possono incontrare^{10,11}, come la pressione scolastica, le relazioni con i pari, le aspettative e i cambiamenti psico-fisici.

È stato osservato che la qualità della relazione con i genitori è associata alla propensione ad adottare comportamenti di salute a rischio. Ad esempio avere una relazione difficile con la madre risulta associato ad una maggiore propensione all'abitudine al fumo e, al consumo frequente di alcol e di altre sostanze^{14,12}.

Una buona comunicazione con la figura paterna può avere un effetto positivo sul benessere percepito^{13,13}. In particolare, negli adolescenti con una comunicazione positiva con il padre si osserva una minore incidenza di sintomi depressivi,¹⁴ comportamenti antisociali^{15,16} e comportamenti di rischio per la salute^{17,18}, una

migliore autostima¹⁹ e meno problemi scolastici²². Nello studio HBSC, la comunicazione familiare è stata indagata chiedendo ai ragazzi di valutare la comunicazione relativa ad aspetti che li preoccupavano con le persone con cui vivono (madre, padre, patrigno o matrigna). Le modalità di risposta alla domanda “Quanto è facile per te parlare di cose che ti preoccupano veramente” sono distribuite su una scala di tipo ordinale da “molto facile” a “non ho o non vedo questa persona”. Nelle tabelle 2.3 e 2.4 si possono osservare le risposte relative a ciò che i ragazzi riferiscono rispetto alla facilità di comunicare sia con il padre che con la madre.

Tabella 2.3: Quanto è facile per te parlare con tuo **padre** di cose che ti preoccupano veramente? per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Molto facile	36,4	16,8	10,5
Facile	33,3	33,6	39,8
Difficile	18,7	29,6	30,1
Molto difficile	8,5	17,9	18,3
Non ho o non vedo mai questa persona	3,1	2,1	1,3
Totale	100	100	100

Tabella 2.4: Quanto è facile per te parlare con tua **madre** di cose che ti preoccupano veramente? per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Molto facile	50,9	28,2	19,7
Facile	31,2	39,3	44,1
Difficile	11,4	19,9	26,3
Molto difficile	6,2	11,2	8,6
Non ho o non vedo mai questa persona	0,3	1,4	1,3
Totale	100	100	100

Confrontando le due tabelle (2.3 e 2.4) appare più facile per i ragazzi parlare delle proprie preoccupazioni con la madre anche se pare di cogliere rispetto ai 4 anni precedenti un lieve aumento della difficoltà a parlare con i genitori.

Se si prende in considerazione il rapporto genitori/figli rispetto al genere, si osservano differenze in tutte le età nella comunicazione con il padre e la madre (figura 2.1 e 2.2) la comunicazione è facile/molto facile più frequentemente per i ragazzi rispetto alle ragazze.

Figura 2.1 Frequenza di coloro che dichiarano essere facile o molto facile parlare con il padre, per genere ed età (%)





Figura 2.2 Frequenza di coloro che dichiarano essere facile o molto facile parlare con la madre, per genere ed età (%)



LO STATUS SOCIO-ECONOMICO FAMILIARE

La condizione socio-economica familiare è un'altra dimensione che influenza fortemente la salute dei ragazzi²⁰. Numerosi studi hanno dimostrato che il livello socio-economico influenza positivamente la qualità delle relazioni con i genitori^{21,22} anche in maniera indiretta. È stato infatti osservato che il livello socio-economico è un mediatore della relazione tra la struttura familiare e il benessere psicologico dei ragazzi^{12,23}.

Secondo la definizione adottata dal protocollo dello studio HBSC, lo status socio-economico è rappresentato da una misura composita che incorpora lo status

economico (reddito), lo status sociale (educazione) e lo status professionale (occupazione) così come definito dai seguenti indicatori:

- status economico (reddito): il primo indicatore è relativo al livello dei consumi, che viene assunto come proxy per valutare il reddito (in quanto quest'ultimo è difficilmente conosciuto e definito dai ragazzi). Si cerca dunque di valutare il benessere economico oggettivo, o livello di agiatezza, attraverso la rilevazione della presenza di beni comuni con lo strumento della scala FAS (*Family Affluence Scale*, scala di agiatezza/ricchezza familiare)²⁴. Le risposte sono state sommate e i punteggi totali del FAS sono stati divisi in tre gruppi (basso, medio, alto);
- status sociale (istruzione): il secondo indicatore si riferisce al livello di istruzione dei genitori;
- status professionale (occupazionale): il terzo indicatore si riferisce all'occupazione dei genitori.

A questi indicatori, si aggiunge un quarto elemento di valutazione relativo alla percezione che i ragazzi hanno dello stato di benessere della propria famiglia; ai ragazzi viene infatti chiesto di indicare quanto pensino stia bene la propria famiglia dal punto di vista economico. Le modalità di risposta a questa domanda sono distribuite su una scala ordinale da “*Molto bene*” a “*Per niente bene*”.

Nella tabella 2.5 è riportata la distribuzione delle famiglie secondo il livello socio-economico.

Tabella 2.5 Status socio-economico misurato secondo la Family Affluence Scale (da ‘Basse possibilità di consumo’ ad ‘Alte possibilità di consumo’) (%)

Family Affluence Scale	%
Basso	8,6
Medio	48,2
Alto	43,2
Totale	100

Una famiglia su 2 si colloca nella fascia di “alta possibilità di consumo” (43,2%), mentre il 48,2% è nella fascia di “media possibilità di consumo” e l’8,6% è nella fascia di “basse possibilità di consumo”.

Pare di cogliere come segnale una percentuale seppur piccola è passata dalla media possibilità di consumo a quella più bassa restando invariata la % delle famiglie ad alto consumo

In tabella 2.6 è invece riportata la distribuzione del livello di istruzione dei genitori dichiarato dai ragazzi intervistati

Tabella 2.6 Livello di istruzione del padre e della madre dichiarato dai ragazzi, per età (%)

PADRE	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Licenza elementare	0,4	0	0,7
Licenza media	5,6	16,2	25,3
Scuola professionale	5,6	9,7	16,0
Maturità	13,3	23,7	30,7
Laurea	24,9	23,4	18,0
Non so	50,2	27,0	9,3
MADRE			
Licenza elementare	0,7	0,3	1,3
Licenza media	3,6	9,6	10,0
Scuola professionale	2,9	5,7	12,7
Maturità	19,1	33,7	41,3
Laurea	32,7	28,7	24,7
Non so	41,0	22,0	10,0

Per quanto riguarda il livello d'istruzione dei genitori, si osserva una prevalenza di titoli di studio medio/alto (maturità-laurea). Sembra cresciuto il livello di istruzione rispetto all'indagine precedente soprattutto per le madri.

CONCLUSIONI

La Struttura familiare prevalente risulta ancora composta la coppia con padre e madre anche se altre tipologie familiari risultano in lieve aumento. Sono in aumento rispetto le rilevazioni precedenti i figli unici o al massimo con un solo/a fratello/sorella. Per quanto riguarda la relazioni con i genitori si riconferma che si parla meglio con la madre, fenomeno già presente nelle rilevazioni precedenti, che cala all'aumentare dell'età. Rispetto al padre I maschi parlano maggiormente rispetto alle femmine pur rimanendo comunque anche per loro più facile parlare con la madre. Utilizzando il FAS si vede come una percentuale di famiglie è passata dalla fascia media alla bassa possibilità di consumo. Per entrambi i genitori il livello di istruzione è aumentato particolarmente per quanto riguarda la laurea delle madri.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ¹ Sawyer SM, Afifi RA, Bearinger LH, Blakemore S J, Dick B, Ezech AC, Patton GC. Adolescence: a foundation for future health. *Lancet*. 2012, 378(9826): 1630-1640
- ² Santrock, J.W. (2014). *Adolescence* (15th Edition). New York, NY: McGraw-Hill Education
- ³ Collins WA, Steinberg L. Adolescent development in interpersonal context. In: Eisenberg N, Damon W, Lerner RM, editors. *Handbook of child psychology*. Vol. 3. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons Inc.; 2006:1003–67
- ⁴ Luciano M, Sampogna G, del Vecchio V, Giacco D, Mulè A, de Rosa C, Fiorillo A, Maj M. The family in Italy: cultural changes and implications for treatment, *Int Rev Psychiatry*. 2012;24(2):149-56
- ⁵ Levin KA, Dallago L, Currie C. The association between adolescent life satisfaction, family structure, family affluence and gender differences in parent–child communication. *Soc Indic Res*. 2012;106(2):287–305
- ⁶ Dashiff, C., W., Di Micco, B., Myers and K., Sheppard. 2009. "Poverty and Adolescent Mental Health." *Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing*, 22: 23–32
- ⁷ Cavanagh, S. E., and A. C. Huston. 2008. "The Timing of Family Instability and Children's Social Development." *Journal of Marriage and Family*, 70 (5): 1258–1270
- ⁸ Levin KA, Currie C. Family structure, mother–child communication, father–child communication, and adolescent life satisfaction: a cross-sectional multilevel analysis. *Health Educ*. 2010;110(3):152–68
- ⁹ Dallago L., Santinello M. (2006). Comunicazione familiare: quando funziona con un solo genitore. *Psicologia Clinica dello Sviluppo*, 2: 241-261.
- ¹⁰ Zambon A., Lemma P., Borraccino A., Dalmaso P., Cavallo F. (2006), Socio-economic position and adolescents' health in Italy: the role of the quality of social relations, *European Journal of Public Health*, 16: 627-632.
- ¹¹ Cava MJ, Buelga S, Musitu G. Parental communication and life satisfaction in adolescence. *Span J Psychol* 2014; 17:E98
- ¹² Gutman, L. M., Eccles, J. S., Peck, S., & Malanchuk, O. (2011). The influence of family relations on trajectories of cigarette and alcohol use from early to late adolescence. *Journal of Adolescence*, 34(1), 119-128
- ¹³ Gallarin M, Alonso-Arbiol I. Parenting practices, parental attachment and aggressiveness in adolescence: a predictive model. *J Adolesc*. 2012;35(6):1601–10
- ¹⁴ Demidenko N, Manion I, Lee CM. Father–daughter attachment and communication in depressed and nondepressed adolescent girls. *J Child Fam Stud*. 2015;24:1727–34.
- ¹⁵ Vieno A., Nation M., Pastore M., Santinello M. (2009). Parenting and Antisocial Behavior: A Model of the Relations between Adolescent Self-Disclosure, Parental Closeness, Parental Control, and Adolescent Antisocial Behavior. *Developmental Psychology*, 45:1509-1519.
- ¹⁶ Ackerman, R.A., Kashy, D.A., Donnellan, M.B., Neppl, T., Lorenz, F.O., & Conger, R.D. (2013). The Interpersonal Legacy of a Positive Family Climate in Adolescence. *Psychological Science*, 24(3): 243-250
- ¹⁷ Small ML, Morgan N, Bailey-Davis L, Maggs JL. The protective effects of parent–college student communication on dietary and physical activity behaviors. *J Adolesc Health* 2013;53(2):300–2.
- ¹⁸ Rostad WL, Silverman P, McDonald MK. Daddy's little girl goes to college: an investigation of females' perceived closeness with fathers and later risky behaviors. *J Am Coll Health*. 2014;62(4):213-20
- ¹⁹ Bulanda RE, Majumdar D. Perceived parent–child relations and adolescent self-esteem. *J Child Fam Stud*. 2009;18(2):203–12. 10. Cava M-J, Buelga S, Musitu G. Parental communication and life satisfaction in adolescence. *Span J Psychol*. 2014;17
- ²⁰ Elgar FJ, Britt McKinnon, Torbjørn Torsheim, Christina Warrer Schnohr, Joanna Mazur, Franco Cavallo, Candace Currie (2016) Patterns of Socioeconomic Inequality in Adolescent Health Differ According to the Measure of Socioeconomic Position, *Social Indicators Research* 2016, Volume 127, Issue 3, pp 1169–1180
- ²¹ Kerr M, Stattin H, Biesecker G, et al. Lerner RM, Easterbrooks MA, Mistry J. Relationships With Parents and Peers in Adolescence, *Handbook of psychology*, Vol. 6, Developmental psychology, 2003 NJ John Wiley & Sons
- ²² Hoskins D, (2014) , Consequences of Parenting on Adolescent Outcomes, *Societies* 2014, 4, 506–531
- ²³ Viner RM, Ozer EM, Denny S, Marmot M, Resnick M, Fatusi A, Currie C. Adolescence and the social determinants of health, *The Lancet* 2012; 379(9826): 1641-1652
- ²⁴ Currie CE, Elton RA, Todd J, Platt S. Indicators of socio-economic status for adolescents: the WHO Health Behaviour in School-Aged Children Survey. *Health Education Research*. 1997;12(3):385–397

3. L'AMBIENTE SCOLASTICO

INTRODUZIONE

In adolescenza, l'ambiente scolastico rappresenta un contesto di sviluppo privilegiato in quanto ambiente sociale prossimale in cui l'individuo trascorre buona parte della propria quotidianità e quindi in grado di influenzarne l'adattamento e il benessere.

Il contesto scolastico può agire infatti supportando l'adolescente nel suo percorso di crescita, rappresentando una fonte significativa di sostegno sociale (soprattutto rispetto alle relazioni che si instaurano con coetanei e insegnanti) e favorendo l'acquisizione di competenza, autonomia e capacità di coinvolgimento. Inoltre, un contesto accogliente e supportivo è in grado di stimolare l'indipendenza dell'individuo e la sua partecipazione ai processi decisionali¹.

La scuola può, dunque, rappresentare un contesto positivo di crescita e di promozione del benessere, sia a livello psico-sociale che in relazione a comportamenti legati alla salute.

Obiettivo di questo capitolo è, da un lato, approfondire la percezione del contesto scolastico attraverso una lettura descrittiva delle risposte date dai ragazzi ad alcuni items relativi al loro rapporto con gli insegnanti, con i compagni di classe e con la scuola in generale e, dall'altro, approfondire le caratteristiche (in senso strutturale e organizzativo) del contesto scolastico che i ragazzi sperimentano attraverso una lettura descrittiva delle risposte date dai dirigenti scolastici.


STRUTTURA SCOLASTICA, ORGANIZZAZIONE INTERNA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Le caratteristiche strutturali e organizzative della scuola sono in grado di influenzare il benessere e l'adattamento dell'adolescente². È stato chiesto ai dirigenti scolastici di rispondere ad alcune domande che potessero evidenziare le caratteristiche della scuola in termini di aspetti strutturali e organizzativi e in termini di misure di promozione alla salute adottate, per poter accostare queste informazioni a quelle rilevate dagli studenti, favorendo una miglior comprensione delle differenze negli esiti di salute e comportamenti ad essa associati dei ragazzi.

Si ricorda che le classi dove si è svolta la rilevazione sono raccolte in 4 edifici (medie Fonte dell'Ovo, Medie Serravalle, Centro di formazione Professionale, e Scuole Medie Superiori dislocate nel piccolo territorio sammarinese (60kmq). Le informazioni fornite dai Dirigenti scolastici circa le risorse strutturali della scuola e loro adeguatezza rispetto ai bisogni. Il 75% dei Dirigenti scolastici è d'accordo sul fatto che le scuole andrebbero sottoposte a restauri. Il 50% ritiene anche che le classi non siano adeguate. In una non è presente palestra e cortile.


Il questionario rivolto ai Dirigenti scolastici ha permesso di esplorare anche le eventuali attività di promozione alla salute adottate dalla scuola per favorire negli studenti lo sviluppo e l'acquisizione di competenze in aree significative per il benessere (figura 3.1). Da rilevare che in tutte le scuole le 4 aree indicate sono sviluppate abitualmente (attività fisica e sport e prevenzione di bullismo), mentre per alimentazione e nutrizione e abuso di sostanza alcune scuole hanno risposto sì ma di tanto in tanto. Nessuno risponde no.

Figura 3.1 Misure di promozione alla salute adottate dalla scuola per favorire negli studenti lo sviluppo di competenze in aree significative per il benessere (%)



Una specifica sezione del questionario intendeva indagare il grado di partecipazione degli allievi ad alcuni degli aspetti organizzativi dell'istituzione scolastica (figura 3.2)

Figura 3.2 Frequenza del coinvolgimento degli studenti in alcuni aspetti dell'organizzazione scolastica (%)




La lettura dei dati presenti in figura 3.2 suggerisce un lieve coinvolgimento degli studenti nello sviluppo di politiche o regole scolastiche e in quelle di Promozione della Salute (Raramente/Mai 50%), mentre gli studenti sembrano maggiormente coinvolti nella pianificazione degli eventi scolastici e nelle decisioni scolastiche (75% spesso e qualche volta).

In tutte le scuole sammarinesi esistono per la comunicazione tra direzione e studenti cassette per i suggerimenti o modalità informatiche (forum, blog ecc.) dove gli studenti possono esprimere suggerimenti o lamentele. Anche l'indagine/sondaggio è spesso una modalità spesso seguita. Meno disponibili i dirigenti scolastici a ricevere gli studenti negli orari d'ufficio (50% no).

I Dirigenti scolastici hanno, inoltre, potuto esprimere un giudizio circa la percezione, in termini di rilevanza, di alcune problematiche dell'area in cui è situata la scuola (figura 3.3) e dell'adeguatezza del quartiere in cui si trova la scuola (figura 3.4)


Figura 3.3 Frequenza in termini di rilevanza di alcune problematiche a livello dell'area in cui è situata la scuola (%)



Il problema del traffico è indicato come lieve/moderato da 3 su 4 dirigenti scolastici.

Non vengono considerati problemi dell'area invece la criminalità, la presenza di edifici dismessi/abbandonati, la violenza e la presenza dei rifiuti. Viene segnalato da un dirigente un lieve problema di spaccio e di droghe e da 2 dirigenti presenza di tensioni etniche e religiose.

Figura 3.4 Valutazione dell'adeguatezza del quartiere in cui opera la scuola (%)



A parere unanime dei dirigenti il quartiere in cui opera la scuola appare poco adeguato quale luogo d'incontro per giovani, mentre il 75% lo considera adeguato per i trasporti pubblici e per i luoghi in cui praticare attività sportive.

Ai Dirigenti scolastici è stato inoltre chiesto di esprimere una valutazione delle attività e delle manifestazioni disponibili nel quartiere in cui opera la scuola (tabella 3.3)

Alla richiesta di valutare le attività e le manifestazioni nell'area in cui è situata la scuola, tutti i dirigenti sono d'accordo nel dire che ci sono poche iniziative culturali e punti di ritrovo per il tempo libero dei giovani. Concordano invece sul fatto che esistano nella zona parecchie associazioni che svolgono attività nel sociale. Aspetto che caratterizza un po' tutto il territorio sammarinese.

RAPPORTO CON GLI INSEGNANTI

La qualità del rapporto con gli insegnanti è considerata una delle componenti che maggiormente contribuisce all'adattamento scolastico dell'adolescente³⁻⁴.

Una relazione positiva con i propri insegnanti è associata ad un maggior utilizzo di strategie di coping attivo a scuola¹, è predittiva di un migliore adattamento comportamentale e scolastico⁵⁻⁶, ed influenza il successo scolastico⁷⁻⁸.

Alcuni studi hanno inoltre evidenziato come una relazione positiva con gli insegnanti contribuisca a contenere i comportamenti aggressivi⁹ e rappresenti un fattore protettivo per l'assunzione di comportamenti a rischio¹⁰⁻¹¹.

Al fine di comprendere quale sia la percezione che i ragazzi hanno del rapporto con gli insegnanti è stato chiesto loro di esprimere il proprio grado di accordo (da "molto d'accordo" a "per niente d'accordo") rispetto alle seguenti affermazioni: "I miei insegnanti si interessano a me come persona", "Ho molta fiducia nei miei insegnanti" e "I miei insegnanti mi accettano per quello che sono".

Nella tabelle 3.4, 3.5 e 3.6 sono riportate le risposte dei ragazzi a ciascuna domanda

Tabella 3.4 Grado di accordo dichiarato con l'affermazione "I miei insegnanti si interessano a me come persona", per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Molto d'accordo	26,8	10,0	7,1
D'accordo	40,0	41,6	32,5
Né in accordo né in disaccordo	25,4	29,4	42,2
Non d'accordo	5,8	14,0	14,3
Per niente d'accordo	2,0	5,0	3,9

Tabella 3.5 Grado di accordo dichiarato con l'affermazione "Ho molta fiducia nei miei insegnanti", per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Molto d'accordo	36,7	17,8	7,7
D'accordo	35,1	37,0	34,2
Né in accordo né in disaccordo	21,5	29,9	35,5
Non d'accordo	3,0	8,9	15,5
Per niente d'accordo	3,7	6,4	7,1

Tabella 3.6 Grado di accordo dichiarato con l'affermazione "I miei insegnanti mi accettano per quello che sono", per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Molto d'accordo	53,5	31,8	22,6
D'accordo	32,7	41,3	41,9
Né in accordo né in disaccordo	9,8	19,2	20,1
Non d'accordo	2,0	4,9	13,5
Per niente d'accordo	2,0	2,8	1,9

Nelle tabelle 3.4 e 3.5 3.6 si vede che c'è una grande fiducia negli insegnanti da parte dei ragazzi e che gli insegnanti si interessano ai ragazzi come persona soprattutto e li accettano per quello che sono, nelle fasce di età 11 13 anni mentre più basse sono le percentuali nei 15enni, anche se sempre nei 15enni è alta la percentuale di coloro che si dichiarano ne in accordo ne in disaccordo.

Nella figura 3.5 si può cogliere a colpo d'occhio come il grado di "accordo" o "molto d'accordo" con le singole affermazioni riportate nelle tabelle precedenti sia differente nelle diverse età considerate.

Figura 3.5 Frequenza di ragazzi che dichiarano di essere "d'accordo" o "molto d'accordo" con le tre affermazioni sul modo con cui interagiscono con gli insegnanti, per età (%)



RAPPORTO CON I COMPAGNI DI CLASSE

Il rapporto con i pari all'interno della scuola gioca un ruolo chiave nello sviluppo dell'adolescente^{6,12}. Questo sistema relazionale sembra influenzare il coinvolgimento degli studenti nelle attività scolastiche, e la motivazione al raggiungimento di buoni risultati. Esiste infatti un legame tra relazioni con i coetanei e rendimento scolastico: gli studenti con relazioni carenti con i propri compagni di classe tendono ad avere voti peggiori¹³, mentre avere amici a scuola sembra aumentare il coinvolgimento e la partecipazione ad attività scolastiche¹⁴ e favorire lo sviluppo di comportamenti socialmente adeguati e l'impegno scolastico¹⁵.

Per valutare il rapporto dei ragazzi con i compagni di classe, è stato chiesto loro di indicare il grado d'accordo con le seguenti affermazioni "La maggior parte dei miei compagni di classe è gentile e disponibile" e "I miei compagni mi accettano per quello che sono". (modalità di risposta da "sono molto d'accordo" a "non sono per niente d'accordo"). Nelle tabelle 3.7 e 3.8 sono state riportate le risposte relative alle affermazioni.

Tabella 3.7 Grado di accordo dichiarato con l'affermazione "la maggior parte dei miei compagni è gentile e disponibile", per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Molto d'accordo	36,0	15,2	17,4
D'accordo	38,4	43,8	43,9
Né in accordo né in disaccordo	19,2	27,6	25,8
Non d'accordo	5,4	11,3	9,7
Per niente d'accordo	1,0	2,1	3,2

Tabella 3.8 Grado di accordo dichiarato con l'affermazione "I miei compagni mi accettano per quello che sono", per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Molto d'accordo	50,5	30,5	22,6
D'accordo	34,0	37,9	48,4
Né in accordo né in disaccordo	11,8	19,9	23,8
Non d'accordo	2,0	8,2	3,9
Per niente d'accordo	1,7	3,5	1,3

Come si evince dalla lettura della tabella 3.7, I compagni di classe vengono percepiti come gentili e disponibili. A fronte del 74% di undicenni che sono d'accordo o molto d'accordo con l'affermazione "La maggior parte dei miei compagni è gentile e disponibile" si registra un 59% di tredicenni ed un 61% di quindicenni con la stessa percezione. Anche per quanto riguarda il senso di essere accettati per quello che si è altrettanto elevata anche in questo caso soprattutto tra gli undicenni (84%).

Il grado di accettabilità da parte dei propri compagni è differente tra i maschi e le femmine (figura 3.6 e 3.7) I maschi hanno percentuali più elevate.

Figura 3.6 Frequenza di coloro che sono molto d'accordo o d'accordo con l'affermazione: "la maggior parte dei miei compagni è gentile e disponibile", per età e genere (%)





Figura 3.7 Frequenza di coloro che sono molto d'accordo o d'accordo con l'affermazione: "i miei compagni mi accettano per quello che sono": per età e genere (%)



BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il recente report dell'Unesco¹⁶ che descrive il fenomeno del bullismo in 71 paesi del mondo dice che l'Italia è tra i paesi a minore prevalenza ed è nel gruppo di quelli con trend in riduzione. Il fenomeno è maggiormente rappresentato nelle fasce d'età più giovani e si manifesta in modo differente tra i due generi: manifestazioni più frequentemente di tipo fisico nei maschi e di tipo verbale e psicologico nelle ragazze¹⁶. Per quel che riguarda il fenomeno del cyber bullismo, ancora poco esplorato, in un recente lavoro che ha coinvolto 7 paesi tra cui l'Italia, il fenomeno sembra essere in aumento¹⁷. Non vengono descritte differenze di genere per gli atti legati alla diffusione di foto o di immagini mentre il genere femminile risulta essere più esposto di quello maschile per gli episodi legati all'utilizzo e la diffusione di messaggi di testo. Il cyberbullismo, a differenza del bullismo, sembra aumentare al crescere dell'età probabilmente in parte a causa della maggiore disponibilità di mezzi tecnologici nei ragazzi più grandi. La letteratura sottolinea come non sia ancora possibile discutere se esista una correlazione tra bullismo in riduzione, e cyberbullismo in aumento e se quest'ultimo sia un fenomeno nuovo e indipendente oppure la transizione del bullismo¹⁸.

Un clima positivo tra pari e buone relazioni con le figure adulte di riferimento, soprattutto insegnanti, riducono la probabilità di accadimento di atti lesivi e risultano quindi un forte fattore protettivo¹⁸. Le dinamiche relazionali che i ragazzi costruiscono a scuola e nelle attività strutturate al di fuori della scuola sono un ulteriore elemento protettivo¹⁶.

L'HBSC ha approfondito il tema del bullismo e delle relazioni violente chiedendo ai ragazzi con quale frequenza avessero subito atti di bullismo a scuola nel corso degli ultimi due mesi. La modalità di risposta si distribuisce su una scala a 5 punti da "Mai" a "Più volte alla settimana" (tabella 3.9)


Tabella 3.9 Quante volte hai subito atti di bullismo negli ultimi due mesi, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Non sono stato oggetto di bullismo	86,0	86,0	91,6
Una o due volte	9,7	10,7	4,5
Due o tre volte al mese	1,3	0,4	1,3
Circa una volta alla settimana	0,7	1,1	1,3
Più volte alla settimana	2,3	1,8	1,3

La maggior parte dei ragazzi, a prescindere dall'età, non ha subito episodi di bullismo. Diminuisce in particolar modo tra i 15enni.

Il fenomeno, quando presente, interessa maggiormente i ragazzi rispetto alle ragazze tranne che per i 13enni e decresce con l'età (figura 3.8)

Figura 3.8 Frequenza di coloro che dichiarano di non aver mai subito atti di bullismo negli ultimi 2 mesi, per età e genere (%)




Oltre al bullismo subito, è stato anche chiesto ai ragazzi se avessero mai partecipato ad atti di bullismo contro un pari negli ultimi due mesi (tabella 3.10 e figura 3.9)

Tabella 3.10 Quante volte hai partecipato ad atti di bullismo contro un tuo pari negli ultimi due mesi, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Non ho fatto il bullo con un compagno	90,9	87,1	80,5
Una o due volte	8,4	10,0	11,7
Due o tre volte al mese	0,7	0,7	5,2
Circa una volta alla settimana	0	0,4	0
Più volte alla settimana	0	1,8	2,6


Nella tabella 3.10 e nella figura 3.9 si evidenzia che la maggior parte dei ragazzi, a prescindere dall'età, non ha praticato episodi di bullismo verso un compagno. I due dati tra bullismo "subito" e "praticati" non sono in contraddizione.

Figura 3.9 Frequenza di coloro che dichiarano di non aver mai partecipato ad atti di bullismo contro un compagno negli ultimi 2 mesi, per età e genere (%)




Il Cyberbullismo, una forma di bullismo condotto attraverso strumenti telematici (come ad esempio tramite in internet), è stato oggetto dell'indagine 2018. Anche in questo caso, attraverso due domande specifiche, è stato chiesto ai ragazzi se hanno subito e/o partecipato ad azioni di cyberbullismo (figura 3.10 e figura 3.11).

Figura 3.10 Frequenza di coloro che dichiarano di non aver mai subito azioni di cyberbullismo negli ultimi 2 mesi, per età e genere (%)



Nella figura 3.10 si evidenzia che la maggior parte dei ragazzi, a prescindere dall'età, non ha subito né praticato azioni di cyberbullismo. Questi dati sono riferiti al 2018 e quindi andranno monitorati negli anni successivi

Figura 3.11 Frequenza di coloro che dichiarano di non aver mai praticato azioni di cyberbullismo negli ultimi 2 mesi, per età e genere (%)



Ai ragazzi è stato inoltre chiesto se fossero incorsi in colluttazioni violente (“ti sei azzuffato o picchiato con qualcuno?”) negli ultimi 12 mesi. Nella Tabella 3.11 sono riportate le risposte fornite dai ragazzi, suddivise per fascia d’età.

Tabella 3.11 Negli ultimi 12 mesi, quante volte ti sei azzuffato o picchiato con qualcuno?” per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Mai	69,5	67,5	68,9
Una volta	12,9	15,4	16,9
Due volte	5,4	6,4	8,4
Tre volte	4,4	4,6	0,6
Quattro volte o più	7,8	6,1	5,2

La tabella 3.11 mostra come circa il 70% non è mai stato coinvolto in colluttazioni violente resta comunque il fatto che circa il restante 30% una o più volte colluttazioni

LA SCUOLA

La scuola rappresenta un contesto educativo in cui gli adolescenti trascorrono buona parte della giornata. Per questo è importante considerare le relazioni che l’individuo, in questa fascia d’età, intrattiene con i diversi attori del contesto scolastico (in particolare insegnanti e pari), ma anche con il “contesto scuola” in senso più ampio e complessivo.


In questo studio, il rapporto dei ragazzi con la scuola è stato indagato chiedendo loro cosa pensassero della scuola. La modalità di risposta a questa domanda è distribuita su una scala a 4 punti da “*mi piace molto*” a “*non mi piace per niente*”. In tabella 3.12 si possono osservare le risposte relative a ciò che i ragazzi pensano della scuola nella nostra regione, suddivise per età.

Tabella 3.12 “Attualmente cosa pensi della scuola?”, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Mi piace molto	14,5	6,7	7,1
Abbastanza	51,4	47,7	44,5
Non tanto	23,3	29,9	36,1
Non mi piace per nulla	10,8	15,7	12,3

In figura 3.12 è invece possibile notare le differenze di genere circa le risposte “mi piace molto/abbastanza” la scuola.

Figura 3.12 Frequenza di coloro a cui piace “molto” o “abbastanza” la scuola, per età e genere (%)



Complessivamente, i dati evidenziano come il rapporto dei ragazzi con la scuola tenda a peggiorare al crescere dell'età. Il giudizio positivo sulla scuola risulta più diffuso tra le ragazze in ogni fascia di età

Tra gli 11enni il parere positivo per la scuola è superiore al parere negativo (66% contro 34%) tra i 13 enni questa differenza si riduce (55 verso 45) e i giudizi diventano essenzialmente sovrapponibili tra i 15 enni (52 verso 48).

Anche l'eventuale stress causato dalla scuola è stato indagato chiedendo ai ragazzi di esprimere il loro giudizio tramite una scala a 4 punti da “per niente stressato” a “molto stressato”.

In tabella 3.13 e 3.14 si possono osservare le risposte dei ragazzi della nostra regione, suddivise rispettivamente per età e per genere.

Tabella 3.13 “Quanto ti senti stressato da tutto il lavoro che devi fare per la scuola?”, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Per niente	5,7	6,7	9,6
Un pò	40,9	36,3	35,5
Abbastanza	32,9	34,0	31
Molto	20,5	23,0	23,9

Si sentono stressati dal lavoro che devono fare per la scuola di più gli 11 enni. Soprattutto le femmine.

Tabella 3.14 “Quanto ti senti stressato da tutto il lavoro che devi fare per la scuola?”, per età e genere (%)

	11 anni (%)		13 anni (%)		15 anni (%)	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Per niente	4,4	7,1	11,0	2,8	12,4	4,0
Un pò	37,4	45,0	41,6	31,0	41,9	22,0
Abbastanza	33,5	32,2	29,2	38,6	27,6	38,0
Molto	24,7	15,7	18,2	27,6	18,1	36,0

CONCLUSIONI

Le scuole Sammarinesi risultano sostanzialmente adeguate rispetto ai bisogni. Risultano attive misure di promozione per favorire sviluppo di competenze per quanto riguarda l'attività fisica e sport e prevenzione di violenza e bullismo. Sempre presenti anche se più sporadici per quanto riguarda l'uso di sostanze e alimentazione.

Gli altri problemi citati risultano o non presenti o lievi (criminalità violenza consumo di droghe edifici abbandonati rifiuti traffico e tensioni etniche e religiose)

Dal raffronto con la rilevazione precedente si rileva che la fiducia negli insegnanti, pur rimanendo elevata in generale, è diminuita per 13enni e 15 enni mentre è aumentata negli 11enni. Stesso andamento è evidenziabile anche sulla "accettazione per quello che si è". Si rilevano elevate percentuali di ragazzi che dichiarano di essere ne in accordo ne in disaccordo mantenendo un atteggiamento neutro su cui bisogna prestare attenzione per evitare che si trasformi in un atteggiamento di distacco.

La qualità del rapporto dei ragazzi e delle ragazze con i loro compagni di classe può essere definita molto buona, è maggiore negli 11enni (74,4%) rispetto ai 13 e 15.

Il fenomeno della violenza e del bullismo, è stato evidenziato per l'allarme sociale creato. Dai dati del 2018 si evidenzia che il fenomeno del bullismo è diminuito negli 11enni mentre è sostanzialmente stabile per le altre 2 fasce di età. Nel 2018 risultano aumentate le liti rispetto alla rilevazione precedente tra gli studenti di 15 anni mentre restano stabili tra le altre classi di età.

Per quello che riguarda il cyberbullismo risultano oltre il 90% coloro che dichiarano di non avere mai subito ne praticato azioni di cyberbullismo.

Più della metà degli studenti sammarinesi dichiara di apprezzare la scuola. La valutazione risulta maggiore per i 13 enni, in aumento dal 2014, mentre per i 15 enni è sostanzialmente stabile, e in aumento per gli 11enni. E' maggiormente apprezzata dalle ragazze, rispetto ai coetanei maschi.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

¹Zimmer-Gembeck M.J., Locke E.M. (2007). The socialization of adolescent coping behaviours:relationships with families and teachers. *Journal of Adolescence*, 30: 1–16.

²Crosnoe R., Needham B. (2004). Holism, Contextual variability and the Study of friendship in adolescent development. *Child Development*, 75: 264, 279.

³Vieno A, Santinello M, Pastore M, Perkins DD.Social support, sense of community in school, and self-efficacy as resources during early adolescence: an integrative model. *Am J Community Psychol*. 2007;39:177-90.

⁴Longobardi C, Prino LE, Marengo D, Settanni M. Student-Teacher Relationships As a Protective Factor for School Adjustment during the Transition from Middle to High School. *Front Psychol*. 2016; 23;7:1988.

⁵Hamre BK, Pianta RC. Early teacher-child relationships and the trajectory of children's school outcomes through eighth grade. *Child Dev*. 2001;72:625-38.

⁶ Wang C, Hatziyianni M, Shahaieian A, Murray E, Harrison LJ.The combined effects of teacher-child and peer relationships on children's social-emotional adjustment. *J Sch Psychol*. 2016;59:1-11.

- ⁷Graziano PA, Reavis RD, Keane SP, Calkins SD. The Role of Emotion Regulation and Children's Early Academic Success. *J Sch Psychol.* 2007;45:3-19.
- ⁸Hamre BK, Pianta RC. Early teacher-child relationships and the trajectory of children's school outcomes through eighth grade. *Child Development.* 2001;72:625-638.
- ⁹Hughes JN, Cavell TA, Jackson T. Influence of the teacher-student relationship on childhood conduct problems: a prospective study. *J Clin Child Psychol.* 1999;28:173-84.
- ¹⁰de Jong EM, Koomen HMY, Jellesma FC, Roorda DL. Teacher and child perceptions of relationship quality and ethnic minority children's behavioral adjustment in upper elementary school. *J Sch Psychol.* 2018;70:27-43.
- ¹¹Dudovitz RN, Chung PJ, Wong MD. Teachers and Coaches in Adolescent Social Networks Are Associated With Healthier Self-Concept and Decreased Substance Use. *J Sch Health.* 2017;87:12-20.
- ¹²Lemma P, Borraccino A, Berchiolla P, Dalmaso P, Charrier L, Vieno A, Lazzeri G, Cavallo F. Well-being in 15-year-old adolescents: a matter of relationship with school. *J Public Health.* 2015;37:573-80.
- ¹³Zettergren P. School adjustment in adolescence for previously rejected, average and popular children. *Br J Educ Psychol.* 2003;73:207-21.
- ¹⁴Lynch AD, Lerner RM, Leventhal T. Adolescent academic achievement and school engagement: An examination of the role of school-wide peer culture. *Journal of Youth and Adolescence.* 2013;42:6-19.
- ¹⁵van Rijsewijk LGM, Oldenburg B, Snijders TAB, Dijkstra JK, Veenstra R. A description of classroom help networks, individual network position, and their associations with academic achievement. *PLoS One.* 2018;13:e0208173.
- ¹⁶UNESCO. (2019). Behind the numbers: Ending school violence and bullying. Paris.
- ¹⁷Dalla Pozza, V., Di Pietro, A., Morel, S., & Psaila, E. (2016). Cyberbullying among young people. In European Parliament Think Tank. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU\(2016\)571367_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU(2016)571367_EN.pdf)
- ¹⁸Mascheroni, G. & Cuman, A. (2014). Net Children Go Mobile: Final report. Deliverables D6.4 & D5.2. Milano: Educatt.

4. SPORT E TEMPO LIBERO

INTRODUZIONE

L'attività fisica regolare aiuta a prevenire e curare le malattie non trasmissibili come le patologie cardiache, ictus, diabete, cancro, ipertensione. Aiuta a prevenire anche l'eccesso ponderale e può contribuire a migliorare la salute mentale, la qualità della vita e il benessere degli individui¹.

Ridurre i livelli di inattività fisica è una strategia fondamentale per diminuire il carico delle malattie, come indicato nel “*Global action plan for the prevention and control of NCDs 2013-2020*”² dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); per raggiungere questo ambizioso obiettivo è necessario prendere atto del fatto che i principali determinanti dell'inattività fisica sono associati a cambiamenti sociali e ambientali, come la tecnologia, la globalizzazione e l'urbanizzazione, che stanno trasformando il modo in cui le persone vivono, lavorano, viaggiano e si divertono, incrementando i livelli di sedentarietà³.

Le attività sedentarie, al pari dell'inattività fisica, sono riconosciute come un fattore di rischio per la salute con conseguenze gravi per il benessere in ogni momento del ciclo di vita. Il tempo trascorso in attività sedentarie, come ad esempio lo stare seduti, è associato ad un maggior rischio di morbilità e mortalità^{4,5}. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la sedentarietà sottrae tempo all'attività fisica; alcuni studi hanno, infatti, dimostrato una riduzione del rischio di mortalità quando si sostituisce il tempo impiegato in attività sedentarie con una sessione di attività fisica di pari durata⁶.

Lo stare seduti “*sitting time*” viene considerato un marker del profilo “sedentario” e comprende tutta una serie di attività quali: guardare la TV, stare al computer, stare seduti a leggere o a lavorare, ecc⁷.

Occorre, tuttavia, precisare che un comportamento sedentario è un'attività che comporta una bassa spesa energetica⁸ e non deve essere definito come il mancato raggiungimento dei livelli raccomandati di attività fisica; un individuo, infatti, può trascorrere una grande quantità di tempo in un comportamento sedentario e soddisfare comunque le linee guida per l'attività fisica da moderata a vigorosa⁹.

Promuovere uno stile di vita attivo sin dall'età evolutiva diventa indispensabile e prioritario se si vuole rallentare lo sviluppo di processi patologici a lungo termine e creare abitudini sane per tutta la vita^{10,11}.

Attualmente, il primo Piano d'azione globale per promuovere l'attività fisica - *More active people for a healthier world* – dell'OMS risponde alla richiesta dei governi di avere linee guida aggiornate sulle politiche efficaci per aumentare l'attività fisica in tutta la popolazione e, specialmente, nei gruppi più a rischio come le donne adulte e gli adolescenti¹².

In questa sezione si descrive come e quanto i giovani si muovono e quanto tempo dedicano alle attività sedentarie.

L'ATTIVITA' FISICA

Secondo l'OMS, per i giovani (5-17 anni) i livelli raccomandati di attività fisica includono il gioco, lo sport, i trasporti, la ricreazione, l'educazione fisica, nel contesto delle attività di famiglia, scuola e comunità, in modo da accumulare quotidianamente almeno 60 minuti di attività motoria moderata-intensa¹³.

La partecipazione ad attività motorie, ricreative e sportive, al contrario di televisione e computer, rappresenta, tra i comportamenti messi in atto dai ragazzi, una tra le risorse più importanti per migliorarsi, superare i propri limiti, divertirsi, costruire nuove amicizie e crescere in salute^{14,15}. La pratica sportiva consente, infatti, di attuare

processi di socializzazione, identificazione e strutturazione del carattere, migliora l'autostima ed accresce le competenze relazionali interpersonali, serve ad acquisire una ampia serie di competenze e abilità che non riguardano solo la motricità ma che sono utilissime per la vita futura¹⁶. E' infatti ampiamente dimostrato che i benefici più evidenti che derivano ad un giovane dal praticare un'attività motoria regolare si manifestano non solo nello sviluppo fisico ma anche nel comportamento sociale e nell'autonomia^{17,18}.

Per rilevare il tempo dedicato all'attività fisica svolta dai ragazzi, il protocollo dello studio utilizza la domanda "negli ultimi 7 giorni, quanti giorni hai fatto attività fisica per un totale di almeno 60 minuti al giorno"; in tabella 4.1 e in figura 4. si riportano in percentuale le risposte dei ragazzi rispettivamente per età e genere.


Tabella 4.1 "Nell'ultima settimana quanti giorni hai fatto attività fisica per un totale di almeno 60 minuti al giorno?", per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Non faccio mai attività fisica	2,3	3,2	9,0
Un giorno	7,0	5,7	12,3
Due giorni	11,7	13,3	15,5
Tre giorni	14,0	24,4	18,7
Quattro giorni	19,8	18,0	16,1
Cinque giorni	13,8	15,2	14,2
Sei giorni	13,0	9,2	7,7
Sette giorni	18,4	11,0	6,5

Osservando la tabella 4.1, si nota che il 2.3% dei ragazzi di 11 anni, il 3.2% dei ragazzi di 13 anni ed il 9% dei ragazzi di 15 anni non svolge mai attività fisica, mentre la maggior parte degli intervistati dichiara di fare attività fisica da 4 a 7 volte a settimana, solo per i 15 enni la percentuale tra coloro che fanno attività fisica da 1 a 3 giorni a settimana è sovrapponibile a quelli che la fanno 4-7 volte a settimana.

L'andamento rispetto alla indagini precedenti è maggiore in tutte e tre le fasce di età. Non si può non sottolineare che la maggioranza delle ragazze fa attività fisica per 3 giorni a settimana (22%).

Figura 4.1 Frequenza di attività fisica settimanale (numero di giorni con almeno 60 minuti di attività fisica), per genere (%)



Ai ragazzi è stato anche chiesto di indicare quante volte, al di fuori dell'orario scolastico, facessero esercizio fisico intenso tale da rimanere senza fiato o sudare, per individuare le differenze con un'attività fisica moderata. In tabella 4.2 si riporta in percentuale le risposte dei ragazzi per età.

Tabella 4.2 "Frequenza percentuale della quantità di attività fisica intensa esercitata al di fuori dell'orario scolastico, per età (%)"

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Ogni giorno	16,8	11,7	7,7
Da 4 a 6 volte a settimana	27,9	22,1	26,5
2-3 volte a settimana	36,9	39,2	39,3
Una volta a settimana	10,7	16,4	12,3
Una volta al mese	2,0	3,9	5,8
Meno di una volta al mese	0,7	2,8	1,9
Mai	5	3,9	6,5

Osservando la tabella 4.2, si nota che il 5% dei ragazzi di 11 anni, il 3,9% dei ragazzi di 13 anni ed il 6,5% dei ragazzi di 15 anni non svolge mai attività fisica, mentre la maggior parte degli intervistati svolge attività fisica la di fuori dell'orario scolastico almeno 2-3 volte alla settimana ma una buona percentuale anche di più.

COMPORAMENTI SEDENTARI

I comportamenti sedentari, come ad esempio la visione della TV e l'uso dei device elettronici/videogiochi, sono negativamente associati con la salute e il benessere durante l'adolescenza^{19,20}. Alcuni studi evidenziano un legame tra questi

comportamenti nei ragazzi e l'aumento dello stress, dell'ansia e del consumo di sostanze^{21,22,23}.

Nei bambini e negli adolescenti, esiste una forte relazione, supportata da molteplici evidenze, tra il comportamento sedentario (principalmente "screen time") e l'obesità²⁴. Alcuni studi hanno, inoltre, trovato un'associazione tra il comportamento sedentario e i livelli di pressione arteriosa e il colesterolo totale, ma anche con l'autostima, i problemi di comportamento sociale, l'idoneità fisica e il rendimento scolastico²⁴.

Gli stili di vita sedentari permeano tutti i settori della vita, inclusi il lavoro, la scuola, i trasporti, il tempo libero/svago e le attività spirituali/contemplative. L'elevata prevalenza della sedentarietà e dei suoi esiti avversi ha di fatto aggiunto un paradigma completamente nuovo al campo "dell'attività fisica", incentrato sulla sua comprensione e riduzione^{25,26}.

La sezione del questionario HBSC dedicato alla pratica di attività fisica viene arricchita da alcune domande sulla sedentarietà, ovvero quante ore al giorno vengono trascorse davanti alla televisione e davanti a computer e/o giochi elettronici. Per studiare i modelli di comportamento nella loro globalità il questionario distingue tra giorni settimanali e week-end.

FREQUENZA DELL'USO DI TELEVISIONE, COMPUTER E NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE

L'*American Academy of Pediatrics* affida ai genitori l'importante compito di educare i propri figli ad un uso consapevole e limitato dei diversi media²⁷. I bambini e gli adolescenti di oggi vivono immersi nei media: dalla TV ai media interattivi, quali i social e i videogiochi.

L'utilizzo globale dei media tra gli adolescenti ha continuato a crescere negli ultimi dieci anni, aiutato dal recente aumento dell'uso del telefono cellulare; circa tre quarti degli adolescenti oggi possiedono uno smartphone, che consente l'accesso a Internet, streaming TV/video e "app" interattive, e circa un quarto si definisce "costantemente connesso" a Internet²⁸.

Le evidenze suggeriscono che i bambini e gli adolescenti hanno bisogno di sonno, attività fisica e tempo libero lontano dai media^{29,30}; la famiglia, ma anche i diversi contesti educativi (ad esempio la scuola), sono pertanto chiamati a svolgere un ruolo importante per educare le giovani generazioni ad un uso consapevole delle diverse tipologie di intrattenimento su schermo.

Nelle tabelle 4.3 e 4.4 viene descritta la frequenza d'uso della televisione/DVD/altre forme di intrattenimento su schermo da parte dei ragazzi durante i giorni di scuola e nel fine settimana.

Tabella 4.3 “Di solito nel tuo tempo libero quante ore al giorno guardi la TV, dei video, dei DVD e altre forme di intrattenimento su schermo?” **nei giorni di scuola**, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Mai	4,4	6,8	3,2
Circa mezz'ora	16,8	14,9	14,9
Circa un'ora	28,8	27,1	30,3
Circa 2 ore	29,8	27,4	29,0
Circa 3 ore	12,0	13,5	16,1
Circa 4 ore	4,1	5,7	2,6
Circa 5 ore o più	4,1	4,6	3,9

Tabella 4.4 “Di solito nel tuo tempo libero quante ore al giorno guardi la TV, dei video, dei DVD e altre forme di intrattenimento su schermo?” **nel fine settimana**, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Mai	5,9	4,7	3,9
Circa mezz'ora	10,3	14,0	12,9
Circa un'ora	24,5	21,8	16,9
Circa 2 ore	24,5	23,7	27,7
Circa 3 ore	15,2	18,3	23,2
Circa 4 ore	10,0	10,4	7,7
Circa 5 ore o più	9,6	7,1	7,7

In generale, si osserva come durante i giorni di scuola il tempo passato davanti alla TV per la maggior parte dei ragazzi (rispettivamente il 75.4% degli undicenni il 69.4% dei tredicenni ed il 74.2% dei più grandi) sia pari o inferiore alle due ore giornaliere.

Durante il fine settimana si osservano sostanziali aumenti di ore passate davanti Tv per tutte le fasce di età.

Nelle tabelle 4.5 e 4.6 viene descritta la frequenza d'uso del computer/console/tablet/smartphone e altri device da parte dei ragazzi durante i giorni di scuola e nel fine settimana.

Tabella 4.5 “Di solito nel tuo tempo libero quante ore al giorno passi a giocare al computer, alla console, sui tablet, sullo smartphone o altri device?” **nei giorni di scuola**, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Mai	12,6	16,5	19,5
Circa mezz'ora	22,5	18,7	14,9
Circa un'ora	27,6	24,4	22,8
Circa 2 ore	21,9	19,8	20,2
Circa 3 ore	5,1	11,9	13,0
Circa 4 ore	3,1	4,0	5,8
Circa 5 ore o più	7,2	4,7	3,8


Tabella 4.6 “Di solito nel tuo tempo libero quante ore al giorno passi a giocare al computer, alla console, sui tablet, sullo smartphone o altri device?” **nel fine settimana**, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
Mai	13,0	18,5	24,7
Circa mezz'ora	17,1	14,5	9,7
Circa un'ora	24,0	19,6	14,9
Circa 2 ore	17,8	17,8	13,1
Circa 3 ore	13,7	12,7	16,2
Circa 4 ore	3,4	8,7	11,7
Circa 5 ore o più	11	8,2	9,7

Solo il 72% dei giovani a 11 anni, il 62,9% a 13 anni ed il 57,9% dei più grandi dichiara di usare per circa 2 ore computer/console/tablet/smartphone e altri device durante i giorni di scuola; di contro, durante il fine settimana, le prevalenze sono rispettivamente 58,9% a 11 anni, 51,9% a 13 anni e 37,7% a 15 anni. In generale la frequenza più elevata del tempo dedicato dagli adolescenti a questi device si osserva durante nei giorni di scuola.


In figura 4.2 e 4.3 si riportano le differenze di genere, limitatamente all'uso durante i giorni di scuola e nel fine settimana, di computer/console/tablet/smartphone e altri device.

Figura 4.2 Frequenza del tempo dedicato durante la settimana all'utilizzo di computer/console/tablet, per genere (%)



Per quel che riguarda le differenze di genere si osserva una spiccata preferenza dei ragazzi, rispetto alle coetanee, per i diversi device. Sono infatti solo poco più del 9.8% dei maschi a dichiarare di non utilizzarli mai, contro più del 22.5% delle ragazze.

Figura 4.2 Frequenza del tempo dedicato durante il fine settimana all'utilizzo di computer/console/tablet, per genere (%)



CONCLUSIONI

La percentuale dei ragazzi che praticano regolarmente almeno un'ora di attività fisica al giorno, come raccomandato dalle linee guida internazionali, è aumentata soprattutto per 11enni e 13enni, mentre risulta sostanzialmente stabile per i 15enni. Anche la percentuale di studenti che dichiarano di non fare "Mai" attività fisica è calata tra il 2014 e il 2018. In generale, per ogni fascia d'età considerata, i ragazzi sembrano fare una attività fisica più frequente.

I dati del 2018 sulla sedentarietà restano stabili negli anni infatti la maggior parte dei giovani spende davanti alla TV circa 1-2 ore al giorno.

Relativamente all'uso di computer/console/tablet/smartphone e altri device il dato più rilevante è l'aumento rispetto alla rilevazione precedente dei 15enni che vi passano da 2 a 4 ore allo stesso modo risulta aumentata la percentuale degli 11enni che vi passano da 5 a più ore. Nel fine settimana i maschi sembrerebbero passare più tempo.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

¹ Global recommendations on physical activity for health: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44399/9789241599979_eng.pdf?sequence=1

² Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf?sequence=1

³ Dichiarazione di Bangkok sull'attività fisica per la salute globale e lo sviluppo sostenibile: https://www.dors.it/documentazione/testo/201704/Bkk_italian_DEF.pdf

⁴ Ekelund U, Steene-Johannessen J, Brown WJ, et al. Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women. *Lancet*. 2016;388(10051):1302– 1310

- ⁵ Keadle SK, Moore SC, Sampson JN, Xiao Q, Albanes D, Matthews CE. Causes of death associated with prolonged TV viewing: NIH-AARP Diet and Health Study. *Am J Prev Med.* 2015;49(6):811–821
- ⁶ Rees-Punia E, Evans EM, Schmidt MD, Gay JL, Matthews CE, Gapstur SM, Patel AV. Mortality Risk Reductions for Replacing Sedentary Time With Physical Activities. *Am J Prev Med.* 2019;56(5):736-741.
- ⁷ Owen N. Sedentary behavior: Understanding and influencing adults' prolonged sitting time. *Preventive Medicine* 55 (2012) 535–539)
- ⁸ Biddle S.J., Gorely T, Marshall S.J, Murdey I, Cameron N. (2004). Physical activity and sedentary behaviours in youth: issues and controversies. *The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health*, 124:29–33
- ⁹ Pate RR, Mitchell JA, Byun W, Dowda M. Sedentary behaviour in youth. *Br J Sport Med* 2011; 45: 906–913
- ¹⁰ Rowland TW. Physical Activity, Fitness and Children. In Bouchard C, Blair SN, Haskell W. *Physical Activity and Health. Human Kinetics.* 2007.
- ¹¹ Janssen I., Leblanc A. (2009). Systematic Review of the Health Benefits of Physical Activity in School-Aged Children and Youth. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 11:7-40
- ¹² More active people for a healthier world: <https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/global-action-plan-2018-2030/en/>
- ¹³ WHO (2010). Global strategy on diet, physical activity and health: <http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/en/>
- ¹⁴ Liu M, Wu L, Ming Q. How Does Physical Activity Intervention Improve Self-Esteem and Self-Concept in Children and Adolescents? Evidence from a Meta-Analysis. *PLoS One.* 2015;10(8):e0134804.
- ¹⁵ Rodriguez-Ayllon M, Cadenas-Sánchez C, Estévez-López F et al. Role of Physical Activity and Sedentary Behavior in the Mental Health of Preschoolers, Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Med.* 2019
- ¹⁶ Eime RM, Young JA, Harvey JT, et al. A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents: informing development of a conceptual model of health through sport. *Int J Behav Nutr Phys Act* 2013;15:10-98.
- ¹⁷ EU Working Group “Sport and Health” (2008). EU Physical Activity Guidelines: <http://www.eufic.org/article/en/artid/Guidelines-physical-activity/>
- ¹⁸ Granger E, Di Nardo F, Harrison A, Patterson L, Holmes R, Verma A. A systematic review of the relationship of physical activity and health status in adolescents. *Eur J Pub Health.* 2017;27:100–6
- ¹⁹ Carson V, Hunter S, Kuzik N, Gray CE, Poitras VJ, Chaput J-P, Saunders TJ, Katzmarzyk PT, Okely AD, Connor Gorber S, et al. Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in school-aged children and youth: an update. *Appl Physiol Nutr Metab.* 2016;41:S240–65
- ²⁰ Tremblay, M.S., Leblanc, A.G., Janssen, I., Kho, M.E., Hicks, A., Murumets, K., et al. 2011a. Canadian sedentary behaviour guidelines for children and youth. *Appl. Physiol. Nutr. Metab.* 36(1): 59–64
- ²¹ Pengpid S, Peltzer K. Leisure-Time Sedentary Behavior Is Associated with Psychological Distress and Substance Use among School-Going Adolescents in Five Southeast Asian Countries: A Cross-Sectional Study. *Int J Environ Res Public Health.* 2019 Jun 13;16(12). pii: E2091.
- ²² Allen MS, Walter EE, Swann C. Sedentary behaviour and risk of anxiety: a systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord.* 2019;242:5–13.
- ²³ Stanczykiewicz B, Banik A, Knoll N, Keller J, Hohl DH, Rosińczuk J, Luszczynska A. Sedentary behaviors and anxiety among children, adolescents and adults: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health.* 2019 Apr 30;19(1):459
- ²⁴ de Rezende LF, Rodrigues Lopes M, Rey-López JP, Matsudo VK, Luiz Odo C. Sedentary behavior and health outcomes: an overview of systematic reviews. *PloS One.* 2014 Aug 21;9(8):e105620.
- ²⁵ Rollo S, Gaston A, Prapavessis H. Cognitive and motivational factors associated with sedentary behavior: a systematic review. *AIMS Public Health.* 2016. 10.3934/publichealth.2016.4.956.
- ²⁶ Katzmarzyk PT. Physical activity, sedentary behavior, and health: paradigm paralysis or paradigm shift? *Diabetes.* 2010;59(11):2717-25.
- ²⁷ <https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/American-Academy-of-Pediatrics-Announces-New-Recommendations-for-Childrens-Media-Use.aspx>
- ²⁸ Lenhart A. *Teens, Social Media & Technology Overview 2015.* Washington, DC: Pew Internet and American Life Project; 2015.
- ²⁹ COUNCIL ON COMMUNICATIONS AND MEDIA. *Media Use in School-Aged Children and Adolescents.* *Pediatrics.* 2016 Nov;138(5)
- ³⁰ <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325147/WHO-NMH-PND-2019.4-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

5. ABITUDINI ALIMENTARI E STATO NUTRIZIONALE

INTRODUZIONE

Le abitudini alimentari scorrette sono riconosciute tra i principali determinanti con implicazioni dirette sulla salute individuale^{1,2,3} e sono direttamente correlate alle alterazioni della dieta.

L'alimentazione ha, dunque, un forte impatto sulla salute nel corso di tutta la vita in quanto condiziona lo stato fisico corrente dell'individuo, ma anche la possibilità di sviluppare, nel tempo, patologie cronico degenerative come cancro, diabete, malattie cardiovascolari e obesità^{4,5,6,7}.

Mangiare sano può di fatto salvare la vita e per tale motivo occorre sin da piccoli instaurare e far conoscere corretti stili alimentari⁸. Un giovane con un sano stile di vita avrà maggiori possibilità di divenire un adulto sano il quale, a sua volta, avrà più probabilità di vivere l'età senile in buona efficienza fisica con ovvi vantaggi per i cittadini stessi e per il Sistema Sanitario.

Nei giovani, in particolare durante l'adolescenza, il processo di cambiamento o di consolidamento di comportamenti favorevoli alla salute risulta fondamentale essendo questa un'età in cui, all'esigenza di mantenere uno stato di buona salute, si aggiunge quella di favorire una crescita sana in un momento di trasformazioni fisiche ed emotive.

I comportamenti alimentari degli adolescenti sono influenzati da diversi fattori correlati e la famiglia è stata segnalata come uno dei principali fattori determinanti^{9,10,11}; i genitori, infatti, possono modellare il comportamento alimentare dei loro figli fornendo alimenti sani a casa^{12,13} e incoraggiando scelte alimentari salutari¹⁴. Anche l'ambiente scolastico così come l'influenza tra pari possono condizionare le scelte alimentari di un adolescente¹⁵.

L'OMS nel 2018 ha prodotto una fact sheet ad hoc che fornisce una serie di raccomandazioni per una dieta sana in tutte le fasce della popolazione e individua una serie di azioni che sinergicamente possono portare ad un miglioramento dell'offerta alimentare¹⁶. La dieta, infatti, si evolve nel tempo ed essendo influenzata da molti determinanti sociali ed economici, necessita di interventi multisettoriali ad esempio nell'ambito della governance, dell'agricoltura e dell'industria.

Nella prima parte del capitolo vengono presentati i risultati relativi ad alcune abitudini alimentari dei ragazzi, con particolare riferimento alla colazione e alla variabilità della dieta in termini di alimenti fortemente raccomandati, quali frutta e verdura, e alimenti sconsigliati, quali dolci e bevande zuccherate¹⁷.

La seconda parte del capitolo è invece dedicata allo stato ponderale dei ragazzi; HBSC raccoglie i dati auto-riferiti su peso e statura¹⁸, tramite i quali viene calcolato l'Indice di Massa Corporea (IMC) e successivamente definito lo stato di: sottopeso, normopeso, sovrappeso e obeso utilizzando i valori soglia dell'International Obesity Task Force (IOTF) desunti da Cole et al.^{19,20}; per i confronti internazionali le curve dell'OMS²¹.

L'Indice di Massa Corporea (IMC) di bambini, adolescenti e adulti, pur rimanendo elevato, sembra aver subito in alcuni Paesi ad alto reddito un arresto della crescita (plateau); al contrario, in alcune regioni asiatiche, è in continuo aumento²². Questa fase di plateau non deve, tuttavia, distogliere l'attenzione dal problema dell'obesità, soprattutto quella dei giovani, che rappresenta un fattore di rischio per una serie di morbosità in età adulta con ripercussioni notevoli anche sulla sfera psicologica dell'individuo.

Il capitolo si chiude con un focus sull'igiene del cavo orale proprio perché sono molte le patologie legate ad una igiene non corretta stabilitasi nell'infanzia e nell'adolescenza²³; anche in questo caso, un monitoraggio della diffusione di abitudini di igiene orale nella popolazione giovanile può indicare quali sono le esigenze educative più urgenti in termini di prevenzione. Recenti studi suggeriscono, infatti, che il consumo di alimenti e bevande zuccherate è un chiaro fattore di rischio per la salute orale, in particolare: la carie dentale e l'infiammazione gengivale sono risultate correlate ad una dieta ad alto contenuto di zuccheri mentre, l'erosione dentale e il trauma dentale sono stati più comunemente associati al consumo di bevande zuccherate²⁴.

FREQUENZA E REGOLARITA' DEI PASTI

La colazione rappresenta un pasto estremamente importante per l'equilibrio fisiologico e psicologico, soprattutto nell'infanzia e nell'adolescenza. Saltare questo pasto influenza le capacità di concentrazione e di apprendimento, favorisce il consumo disordinato di snack/"cibi spazzatura" (junk food) e può persistere come abitudine scorretta in età adulta^{25,26,27}.

Ai ragazzi è stato chiesto di indicare la frequenza con cui consumano la prima colazione che rappresenta uno dei pasti principali con cui garantire circa il 20% dell'introito calorico quotidiano durante i giorni di scuola e nel fine settimana.

Nella tabella 5.1 e 5.2 sono riportate rispettivamente le frequenze di consumo della colazione durante la settimana e il fine settimana.

Tabella 5.1 "Di solito quante volte fai colazione (in settimana)?", per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Mai	11,9	21,6	23,5	18,1
Un giorno	3,4	6,5	3,2	4,6
Due giorni	3,1	6,5	5,2	4,8
Tre giorni	5,1	6,9	5,8	5,9
Quattro giorni	5,4	5,8	3,9	5,2
Cinque giorni	71,1	52,7	58,4	61,4

Oltre il 60% dei ragazzi dichiara di fare colazione ogni giorno prima di andare a scuola, ma il consumo quotidiano diminuisce nei 13 enni e risale nei 15enni. Le percentuali riferite a un giorno/due giorni/tre giorni/quattro giorni sono confrontabili sia tra le diverse categorie sia tra le varie classi di età. Alta rispetto a quanto si potrebbe desiderare è la quota di coloro che dichiarano di non fare mai colazione e la loro percentuale aumenta con l'età.

Tabella 5.2 "Di solito quante volte fai colazione (nel fine settimana)?", per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Non faccio mai colazione il fine settimana	5,2	6,6	13,7	7,5
Di solito faccio colazione uno solo tra i giorni del fine settimana (o sabato o domenica)	16,6	27,3	29,4	23,5
Di solito faccio colazione sia il sabato che la domenica	78,2	66,1	56,9	69,0

Nel fine settimana quasi il 70% dei ragazzi dichiara di fare colazione entrambi i giorni del fine settimana, ma il consumo diminuisce al crescere dell'età

Nella tabella 5.3 sono riportate le frequenze degli spuntini che i ragazzi consumano tra i pasti per le diverse classi di età.

Tabella 5.3 "Di solito fai uno spuntino tra i pasti?", per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
No	9,4	6,8	3,2	7,1
Solo metà mattina	11,4	13,9	18,2	13,8
Solo nel pomeriggio	21,4	21,8	19,5	21,1
Sia a metà mattina che nel pomeriggio	57,8	57,5	59,1	58,0

Il 58% dei ragazzi ha l'abitudine di consumare uno spuntino sia la mattina che il pomeriggio, indifferentemente dall'età. Circa il 34% dei ragazzi consuma la merenda una volta al giorno, mattina o pomeriggio. Non si evidenziano particolari differenze per classi di età.

Nel 2018 è stata introdotta una nuova domanda con la finalità di rilevare la frequenza del consumo dei pasti insieme in famiglia. Nella tabella 5.4 sono riportate le frequenze riferite al numero di pasti consumati insieme alla famiglia durante la settimana per le diverse classi di età.

Tabella 5.4 "Quante volte tu e la tua famiglia consumate pasti insieme?", per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Ogni giorno	45,4	50,3	48,4	47,9
La maggior parte dei giorni	40,9	40,1	43,9	41,2
Circa una volta alla settimana	7,7	4,3	4,5	5,7
Meno di una volta alla settimana	1,3	1,4	1,9	1,5
Mai	4,7	3,9	1,3	3,7

Il 90% degli intervistati dichiara che consuma i pasti insieme alla famiglia ogni giorno e nella maggior parte dei giorni indipendentemente dalle età "Ogni giorno"; le frequenze sono simili nelle diverse classi di età. Anche per le altre categorie di consumo non si evidenziano particolari differenze

CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA

Le linee guida nazionali e internazionali sulla sana alimentazione¹⁷ consigliano di assumere 5 porzioni al giorno di frutta e/o verdura in quanto garantiscono l'apporto di acqua, fibre, vitamine e sali minerali, importanti per una sana alimentazione. Inoltre, diverse evidenze scientifiche suggeriscono che l'elevato consumo di fibre è associato a una riduzione del rischio di sviluppare patologie croniche invalidanti (diabete, cancro, dislipidemia, ecc.)²⁸.

Ai ragazzi coinvolti nell'indagine è stato dunque chiesto di indicare la frequenza settimanale del consumo di frutta e verdura al fine di delinearne il consumo abituale


Tabella 5.5 “Di solito quante volte alla settimana mangi frutta?”, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Mai	2,7	6,0	5,8	4,6
Meno di una volta a settimana	8,8	7,4	2,6	6,9
Una volta a settimana	11,7	13,1	16,8	13,3
Tra 2 e 4 giorni a settimana	26,6	30,1	38,6	30,6
Tra 5 e 6 giorni a settimana	13,5	16,6	12,3	14,4
Una volta al giorno tutti i giorni	20,5	14,1	16,8	17,3
Più di una volta al giorno	16,2	12,7	7,1	12,9

Complessivamente il consumo di frutta con frequenza maggiore si evidenzia per le categorie “Tra 2 e 4 giorni a settimana” e “Una volta al giorno tutti i giorni”. In generale non si evidenziano sostanziali differenze tra le classi di età, anche se si nota una percentuale inferiore nei ragazzi di 15 anni.

Nella figura 5.1 sono riportate le frequenze percentuali del consumo di frutta su base settimanale distinte per maschi e femmine.

Figura 5.2 Frequenza del consumo di frutta, per genere (%)



Per quanto riguarda le differenze di genere le frequenze di consumo di frutta sono generalmente più a favore della componente femminile.

Tabella 5.6 “Di solito quante volte alla settimana mangi verdura?”, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Mai	4,7	6,4	3,2	5,1
Meno di una volta a settimana	5,8	8,6	3,2	6,3
Una volta a settimana	6,4	8,2	11,0	8,1
Tra 2 e 4 giorni a settimana	21,8	23,2	32,6	24,5
Tra 5 e 6 giorni a settimana	22,7	16,1	18,2	19,2
Una volta al giorno tutti i giorni	16,9	19,3	19,5	18,4
Più di una volta al giorno	21,7	18,2	12,3	18,4

Complessivamente il consumo di verdura con frequenza maggiore si evidenzia per le categorie “Tra 2 e 4 giorni a settimana” con una percentuale maggiore nei 15 anni.

Nella figura 5.2 sono riportate le frequenze percentuali di consumo di verdura su base settimanale distinte per maschi e femmine.

Figura 5.2 Frequenza del consumo di verdura, per genere (%)



Per quanto riguarda le differenze di genere le frequenze di consumo di verdura sono generalmente a favore delle femmine

CONSUMO DI DOLCI E BEVANDE GASSATE

L’assunzione di grassi e zuccheri in eccesso è un’abitudine sempre più diffusa, in buona parte dovuta al consumo di prodotti dell’industria alimentare che contengono quantità notevoli di tali nutrienti ^{29,30}.

Nelle tabelle 5.7 e 5.8 sono riportate per le diverse fasce di età le frequenze settimanali del consumo di dolci, caramelle o cioccolato, cola o altre bibite con zucchero.

Tabella 5.7 “Di solito quante volte alla settimana mangi dolci, caramelle o cioccolato?”, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Mai	4,8	2,1	1,9	3,2
Meno di una volta a settimana	15,7	7,5	9,1	11,1
Una volta a settimana	14,4	14,2	10,5	13,5
Tra 2 e 4 giorni a settimana	25,7	31,0	38,3	30,4
Tra 5 e 6 giorni a settimana	15,1	20,3	21,4	18,4
Una volta al giorno tutti i giorni	11,6	14,2	13,6	13,1
Più di una volta al giorno	12,7	10,7	5,2	10,3

Tabella 5.8 “Di solito quante volte alla settimana bevi cola o altre bibite con zucchero?”, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Mai	17,1	18,1	12,9	16,6
Meno di una volta a settimana	25,2	22,0	20,0	22,8
Una volta a settimana	24,8	32,6	21,9	27,2
Tra 2 e 4 giorni a settimana	18,5	16,7	29,7	20,1
Tra 5 e 6 giorni a settimana	7,0	5,0	7,1	6,3
Una volta al giorno tutti i giorni	3,7	2,8	7,1	4,1
Più di una volta al giorno	3,7	2,8	1,3	2,9

In generale il consumo settimanale di dolci risulta maggiore rispetto al consumo di bevande con zucchero. Per quanto riguarda le classi di età generalmente i consumi risultano maggiori per i 15enni.

Nella tabella 5.9 sono riportate per le diverse fasce di età le frequenze settimanali del consumo di legumi.

Tabella 5.9 “Di solito quante volte alla settimana mangi legumi?”, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Mai	20,1	23,8	16,2	20,7
Meno di una volta a settimana	18,8	20,2	20,1	19,6
Una volta a settimana	22,4	24,1	22,8	23,2
Tra 2 e 4 giorni a settimana	21,4	20,6	30,6	23,0
Tra 5 e 6 giorni a settimana	8,8	7,1	7,8	7,9
Una volta al giorno tutti i giorni	5,4	2,1	1,9	3,4
Più di una volta al giorno	3,1	2,1	0,6	2,2

Il 23% dei ragazzi mangia i legumi tra 2 e 4 giorni a settimana, mentre il 20,7% dichiara di non assumerli mai; tra 2 e 4 giorni sembra che i 15 enni ne mangino di più

In tabella 5.10 si riporta la frequenza di consumo quotidiana di alcuni alimenti.

Tabella 5.10 Frequenze di “Consumo almeno una volta al giorno tutti i giorni” con indicatori sintetici, per età e genere (%)

	11 anni (%)		13 anni (%)		15 anni (%)	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Frutta	37,7	35,5	21,7	31,7	14,3	44,0
Verdura	33,5	44,5	28,5	46,2	26,9	42,0
Legumi	9,0	8,0	3,6	4,8	1,0	6,1
Cola o altre bibite zuccherate/gassate	8,2	6,5	5,8	5,6	10,5	4,0
Snack salati	7,6	12,3	4,4	8,3	3,9	4,0
Cereali (come corn flakes, muesli, ecc.)	20,4	14,7	17,8	12,4	11,5	14,0
Cereali (pane, pasta, riso)	51,9	46,7	55,1	58,6	58,1	53,1

Basso il consumo di legumi, più alto il consumo di frutta e verdura anche se non si raggiunge il 50% degli intervistati. Più del 50% consuma cereali (pane pasta e riso).

STATO NUTRIZIONALE


E' stato chiesto ai ragazzi di dichiarare il proprio peso e altezza, così da poter calcolare l'Indice di Massa Corporea ($IMC=kg/m^2$) e classificare i ragazzi in sottopeso, normopeso, sovrappeso e obesi. Tale classificazione è stata operata secondo le tavole di Cole¹⁹⁻²⁰ in modo separato per età e sesso. Nella tabella 5.11 sono riportate le frequenze riferite alle classi di età 11, 13 e 15 anni. La figura 5.4, evidenzia le distribuzioni percentuali del campione in relazione alla classe di IMC distinte per età (11, 13 e 15 anni) e per genere.

Tabella 5.11 Valutazione del peso in base al IMC (calcolato su peso e altezza dichiarati), per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Sottopeso	4,4	2,0	3,4	3,3
Normopeso	81,5	82,6	76,9	80,9
Sovrappeso	13,3	11,8	19,0	14,0
Obeso	0,8	3,6	0,7	1,8

La maggior parte dei ragazzi risulta essere normopeso con percentuale del 81%. I ragazzi sottopeso sono il 3.3%, i sovrappeso sono il 14.0% e gli obesi sono il 1.8%. I 13 enni hanno una % di sovrappeso e obesità inferiore alla alte fasce di età mentre la percentuale più alta di sovrappeso si trova nei 15enni.

Figura 5.4 Frequenza di sovrappeso e obesità per genere ed età (%)



In tutte le fasce di età i maschi sono maggiormente in sovrappeso e obesità.

INSODDISFAZIONE CORPOREA

Gli adolescenti spesso riportano dei sentimenti d'insoddisfazione corporea, intesa come un sentimento di scontentezza per forma, peso, altezza o altri aspetti del corpo; causato da una distorsione percettiva/affettiva o da dati oggettivi³¹. Tale insoddisfazione riguarda principalmente il proprio peso e il percepirsi "troppo grasse/i", indipendentemente dal fatto di essere oggettivamente sovrappeso o meno. Ai ragazzi è stato chiesto di pensare al proprio corpo e di riportare come si vedono tra le seguenti opzioni: (i) decisamente troppo magro, (ii) un po' troppo magro, (iii) più o meno della taglia giusta, (iv) un po' troppo grasso, (v) decisamente troppo grasso. Le risposte decisamente troppo grasso e un po' troppo grasso possono essere aggregate per descrivere il percepire di essere in sovrappeso³².

Nella tabella 5.12 sono riportate le frequenze riferite alla percezione del proprio corpo per le classi di età 11, 13 e 15 anni.


Tabella 5.12 "Pensi che il tuo corpo sia...", per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Decisamente troppo magro	3,0	2,1	2,0	2,5
Un po' troppo magro	11,4	6,1	9,9	9,0
Più o meno della taglia giusta	65,0	61,9	60,3	62,8
Un po' troppo grasso	18,9	26,3	25,8	23,2
Decisamente troppo grasso	1,7	3,6	2,0	2,5

In generale il 63% dei ragazzi si percepisce "Più o meno della taglia giusta", "Un po' troppo grasso" e "Un po' troppo magro" circa il 23,2% e il 9% rispettivamente. Soprattutto tra i 13enni e 15enni e tra le femmine

Nella figura 5.5 è evidenziata la percentuale dei ragazzi di 11, 13 e 15 anni che si percepisce in sovrappeso (“Un po’ troppo grasso” e “Decisamente troppo grasso”) distinta per genere.

Figura 5.5 Frequenza di coloro che si sentono grassi o molto grassi, per età e genere (%)



All’aumentare dell’età aumenta la quota di coloro che si percepiscono “grassi o molto grassi”, tale convinzione è maggiore nelle femmine

Nella tabella 5.13 sono riportate le frequenze dei ragazzi che si percepiscono “Un po’ troppo grasso” e “Decisamente troppo grasso” in relazione al proprio IMC (dichiarato), per classe di età.

Tabella 5.13 Frequenza di ragazzi che si percepiscono grassi o molto grassi rispetto al proprio IMC, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Sottopeso	2,9	10,0	20,0	8,9
Normopeso	16,3	24,2	17,8	19,7
Sovrappeso	51,5	56,7	65,4	57,3
Obeso	100,0	66,7	100,0	75,0

La maggior parte dei ragazzi che si percepisce “Un po’ troppo grasso” e “Decisamente troppo grasso” risulta avere un IMC sovrappeso/obeso. Tuttavia una percentuale non trascurabile (20%) di ragazzi normopeso si considera troppo grasso; tale fenomeno è maggiormente presente nei 13enni.

Ai ragazzi è stato anche chiesto se nel periodo in cui hanno compilato il questionario fossero a dieta; in tabella 5.14 è possibile consultare quanto dichiarato dai ragazzi.

Tabella 5.14 “In questo periodo sei a dieta o stai facendo qualcosa per dimagrire?”, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
No, il mio peso è quello giusto	51,7	41,0	41,9	45,5
No, ma dovrei perdere qualche chilo	20,6	29,0	27,8	25,4
No, perché dovrei mettere su qualche chilo	10,7	9,2	13,5	10,7
Sì	17	20,8	16,8	18,4

In generale il 45.5% dei ragazzi dichiara di non essere a dieta in quanto considerano il proprio peso giusto. Il 25.4% non è a dieta ma dovrebbe intervenire in quanto ritiene il proprio peso eccessivo. Il 18.4% dei ragazzi è a dieta. Tra gli 11 enni più della metà ritiene di avere il peso giusto.

IGIENE ORALE

L’abitudine di lavarsi i denti è essenziale per la prevenzione della carie dentale, la più diffusa delle patologie del cavo orale nei paesi industrializzati. In tabella 5.15 si evidenzia quanto riportato dai ragazzi.

Tabella 5.15 “Quante volte al giorno ti lavi i denti?”, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Più di una volta al giorno	67,3	65,0	57,4	64,5
Una volta al giorno	27,3	30,3	39,4	31,0
Almeno una volta alla settimana ma non tutti i giorni	4,7	3,9	2,6	3,9
Meno di una volta alla settimana	0	0,4	0	0,1
Mai	0,7	0,4	0,6	0,5

Più del 95 % si lava i denti almeno 1 volta al giorno. I più piccoli anche più di una volta al giorno.

CONCLUSIONI

Non fa colazione nei giorni scolastici circa il 20% dei ragazzi. Percentuale in diminuzione rispetto alle rilevazioni precedenti con particolare evidenza tra gli 11enni. Per quel che riguarda i 15 enni ha un lieve aumento nel 2018 rispetto al 2014. La percentuale invece di chi fa sempre colazione è in aumento ed è la più alta tra gli 11enni. Considerando i 15enni del 2018 che erano gli 11enni della rilevazione precedente del 2014 si nota che la percentuale di chi fa colazione è diminuita. Sembra quindi che i ragazzi all'aumentare dell'età facciano meno colazione al mattino.

Per quello che riguarda lo spuntino viene fatto due volta al giorno da circa il 60% degli intervistati, in aumento rispetto alla rilevazione precedente.

Il consumo di frutta "Più di una volta al giorno" ha frequenze percentuali maggiori nelle femmine rispetto ai maschi e tende a diminuire all'aumentare dell'età, in flessione rispetto al 2014

Il consumo di verdure "Più di una volta al giorno" è in lieve aumento rispetto al 2014 ad eccezione dei 15enni le percentuali si aggirano intorno al 35% quindi piuttosto bassa ed è più frequente per le femmine rispetto ai coetanei.

La frequenza di utilizzo di bibite zuccherate "Più di una volta al giorno" nel 2018 diminuisce rispetto al 2014, tranne che nei 15enni.

Per quanto riguarda lo stato nutrizionale la prevalenza di sovrappeso e obesità risulta essere in aumento nei 15enni ed è diminuito nelle altre classi di età, rispetto alla precedente raccolta dati.

In generale la percezione del proprio stato di sovrappeso e obesità è corretto rispetto al dato del BMI pertanto è un dato da tenere in considerazione per gli eventuali interventi. Di coloro che risultano essere in sovrappeso il 18% ha interventi di tipo dietetico alimentare.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

¹ World Health Organization. European Food and Nutrition Action Plan 2015-2020. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2014;

² Willett WC, Stampfer MJ. Current evidence on healthy eating. *Annu Rev Public Health* 2013; 34: 77–95

³ Micha R, Shulkin ML, Peñalvo JL, et al. Etiologic effects and optimal intakes of foods and nutrients for risk of cardiovascular diseases and diabetes: systematic reviews and meta-analyses from the Nutrition and Chronic Diseases Expert Group (NutriCoDE). *PLoS One* 2017; 12: e0175149

⁴ World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Diet, nutrition, physical activity and cancer: a global perspective. Continuous Update Project Expert Report, 2018. <https://www.wcrf.org/dietandcancer> (accessed Feb 19, 2019)

⁵ Katz DL, Meller S. Can we say what diet is best for health? *Annu Rev Public Health*. 2014;35:83-103

⁶ Das JK, Salam RA, Thornburg KL, Prentice AM, Campisi S, Lassi ZS, Koletzko B, Bhutta ZA. Nutrition in adolescents: physiology, metabolism, and nutritional needs. *Ann N Y Acad Sci*. 2017 Apr;1393(1):21-33

⁷ Centers for Disease Control and Prevention (2011). Morbidity and Mortality Weekly Report. <http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6005.pdf>.

⁸ GBD 2017 Diet Collaborators. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *Lancet*. 2019 May 11;393(10184):1958-1972.

⁹ Watts A.W., Loth K., Berge J.M., Larson N., Neumark-Sztainer D. No Time for Family Meals? Parenting Practices Associated with Adolescent Fruit and Vegetable Intake When Family Meals Are Not an Option. *J. Acad. Nutr. Diet*. 2017;117:707–714.

- ¹⁰ Salvy S.J., Miles J.N., Shih R.A., Tucker J.S., D'Amico E.J. Neighborhood, family and peer-level predictors of obesity-related health behaviors among young adolescents. *J. Pediatr. Psychol.*
- ¹¹ Ferris K.A., Babskie E., Metzger A. Associations between Food-Related Parenting Behaviors and Adolescents' Engagement in Unhealthy Eating Behaviors: The Role of Nutrition Knowledge. *Int. J. Aging Hum. Dev.* 2017;84:231–246.
- ¹² Loth K.A., MacLehose R.F., Larson N., Berge J.M., Neumark-Sztainer D. Food availability, modeling and restriction: How are these different aspects of the family eating environment related to adolescent dietary intake? *Appetite.* 2016;96:80–86
- ¹³ Hebestreit A., Intemann T., Siani A., De Henauw S., Eiben G., Kourides Y.A., Kovacs E., Moreno L.A., Vedidebaum T., Krogh V., et al. On behalf of the I. Family Consortium. Dietary Patterns of European Children and Their Parents in Association with Family Food Environment: Results from the I. *Nutrients.* 2017;9:126.
- ¹⁴ Hebestreit A., Intemann T., Siani A., De Henauw S., Eiben G., Kourides Y.A., Kovacs E., Moreno L.A., Vedidebaum T., Krogh V., et al. On behalf of the I. Family Consortium. Dietary Patterns of European Children and Their Parents in Association with Family Food Environment: Results from the I. *Nutrients.* 2017;9:126.
- ¹⁵ Salvy S.J., Howard M., Read M., Mele E. (2009). The presence of friends increases food intake in youth. *American Journal of Clinical Nutrition,* 90:282-7.
- ¹⁶ https://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/healthy_diet_fact_sheet_394.pdf?ua=1
- ¹⁷ Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - INRAN. Linee guida per una sana alimentazione italiana (http://nut.entecra.it/648/linee_guida.html).
- ¹⁸ Currie C., Samdal O., Boyce W., eds (2001). *Health Behaviour in School-aged Children: a World Health Organization cross-national study (HBSC). Research protocol for the 2001/2002 survey.* Edinburgh, Child and Adolescent Health Research Unit, University of Edinburgh.
- ¹⁹ Cole JT, Bellizzi MC, Flegal KM, et al. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: International survey. *BMJ* 2000;320:1240-5.
- ²⁰ Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D, et al. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. *BMJ* 2007;335(7612):194.
- ²¹ World Health Organization. *Physical status: the use and interpretation of anthropometry.* Report of a WHO Expert Committee. (WHO Technical Report Series; 854). Geneva: WHO; 1995.
- ²² NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128 · 9 million children, adolescents, and adults. *Lancet* 2017; 390(10113):2627-42.
- ²³ Asawa K, Sen N, Bhat N, Tak M, Sultane P, Patil V. Association of sugary foods and drinks consumption with behavioral risk and oral health status of 12- and 15-year-old Indian school children. *J Educ Health Promot.* 2018;7:19.
- ²⁴ Hoyland A., Dye L., Lawton C.L. (2009). A systematic review of the effect of breakfast on the cognitive performance of children and adolescents. *Nutrition Research Reviews,* 22:220-43.
- ²⁵ Kant A.K., Andon M.B., Angelopoulos T.J., Rippe J.M.(2008). Association of breakfast energy density with diet quality and body mass index in American adults: National Health and Nutrition Examination Surveys. *American Journal of Clinical Nutrition,* 5:1396-404.
- ²⁶ Hallström L, Labayen I, Ruiz JR, et al. Breakfast consumption and CVD risk factors in European adolescents: the HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) Study. *Public Health Nutr* 2013;16(7):1296-305.
- ²⁷ Lazzeri G, Pammolli A, Azzolini E, et al. Association between fruits and vegetables intake and frequency of breakfast and snacks consumption: a cross-sectional study. *Nutr J* 2013;12:123.
- ²⁸ Veronese N, Solmi M, Caruso MG, Giannelli G, Osella AR, Evangelou E, Maggi S, Fontana L, Stubbs B, Tzoulaki I. Dietary fiber and health outcomes: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. *Am J Clin Nutr.* 2018 Mar 1;107(3):436-444.
- ²⁹ Malik V.S., Popkin B.M., Bray G.A., Despres J.P., Willett W.C., Hu F.B.(2010). Sugar-sweetened beverages and risk of metabolic syndrome and type 2 diabetes: a meta-analysis. *Diabetes Care,* 33:2477–83.
- ³⁰ Vartanian L.R., Schwartz M.B., Brownell K.D. (2007) Effects of soft drink consumption on nutrition and health: a systematic review and meta-analysis. *American Journal of Public Health,*97:667–75.
- ³¹ Palmonari A. (a cura di) (2011), *Psicologia dell'adolescenza,* Il Mulino, Bologna.
- ³² Whitehead, R., Berg, C., Cosma, A., Gobina, I., Keane, E., Neville, F., & Kelly, C. (2017). Trends in adolescent overweight perception and its association with psychosomatic health 2002–2014: evidence from 33 countries. *Journal of Adolescent Health,* 60(2), 204-211.

6. COMPORTAMENTI DI DIPENDENZA

INTRODUZIONE

Questo capitolo affronta una delle tematiche maggiormente discusse in tema di promozione della salute in preadolescenza e adolescenza: i comportamenti a rischio. In questo periodo della vita, infatti, le relazioni sociali subiscono cambiamenti radicali, i pari acquisiscono sempre maggiore importanza e aumenta la probabilità di sperimentare e adottare comportamenti che possono avere conseguenze sulla salute. Fra questi l'uso di sostanze lecite, come il tabacco e l'alcol, o illecite quali la cannabis o altre sostanze psicoattive. Nell'ultima indagine, inoltre, sono stati inseriti, per i soli quindicenni, quesiti volti ad indagare le loro esperienze col gioco d'azzardo, riconosciuto oramai come un'altra importante tematica da affrontare in ambito di sanità pubblica, anche fra i più giovani.

USO DI SOSTANZE

L'iniziazione dei giovani al fumo di tabacco e all'utilizzo di altre sostanze avviene per lo più in epoca adolescenziale e nell'ambito del gruppo che, a questa età, acquisisce sempre maggiore importanza. Ci sono diverse ragioni per cui gli adolescenti decidono di utilizzare sostanze psicotrope incluso il desiderio di provare nuove esperienze, il tentativo di affrontare problemi o di essere socialmente più accettati, o semplicemente rispondere alla pressione dei pari. I preadolescenti e gli adolescenti sono considerati "biologicamente programmati" per la ricerca di nuove esperienze e per l'adozione di comportamenti così come sono impegnati nella costruzione della loro identità. Provare droghe, siano esse legali o illegali, può soddisfare queste normali esigenze ma in modo non salutare con possibili ripercussioni nella loro vita futura¹. Da questo punto di vista, la fascia d'età dei teen-agers è considerata una finestra temporale particolarmente vulnerabile all'uso di sostanze a causa del fatto che il cervello si trova ancora in una fase di sviluppo e malleabilità (chiamata neuro plasticità) in cui alcune aree sono più mature di altre. La parte del cervello che processa il rinforzo ed il dolore, cruciali nell'assunzione di sostanze, matura prima della corteccia prefrontale responsabile del controllo delle emozioni e degli impulsi oltre che della presa di decisioni².

In linea generale bisogna considerare che non c'è un unico fattore responsabile dell'uso delle sostanze psicoattive, ma una serie di fattori che interagiscono fra di loro. Sono infatti vari i fattori che possono influenzare l'assunzione di sostanze durante l'adolescenza inclusa la loro disponibilità nella comunità di residenza o nella scuola, o l'utilizzo da parte dei propri amici. Anche la famiglia sembra rivestire un ruolo importante: violenza, abuso, malattie psichiatriche e uso da parte dei genitori incrementano la probabilità di utilizzo da parte dei figli³⁻⁴. Infine, esistono delle vulnerabilità ereditarie che spesso si combinano con caratteristiche di personalità (es. impulsività o sensation seeking) o a condizioni come depressione, ansia e Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) che possono rendere più probabile l'uso di sostanze durante la fase adolescenziale⁵. I fenomeni di abuso, riconosciuti fra i comportamenti a rischio tipici dell'adolescenza, hanno sulla salute un impatto ampiamente documentato: da quelli immediati come la mortalità per incidenti a quelli a distanza nel tempo come le patologie tumorali. Fra i problemi correlati all'utilizzo di sostanze occorre però considerare anche quelli non sanitari: disordini familiari e sociali e problemi di ordine economico non solo individuali.

In accordo con il “*Global burden of disease, injuries and risk factors study*”- 2013⁶⁻⁷, l’uso di alcol e tabacco e secondariamente l’uso di sostanze illegali sono i principali fattori di rischio per morti premature e morbilità, espressa in termini di anni di vita adattati alla disabilità (disability-adjusted life years, DALYs). La riduzione del consumo di sostanze è quindi, per l’OMS, fra gli obiettivi prioritari nel XXI secolo in tema di promozione della salute.

FUMO

Nonostante siano da tempo ben note le conseguenze negative sulla salute sia a lungo, che a medio e breve termine, il consumo di tabacco rimane la principale causa di morte prevenibile, con costi enormi dovuti alle patologie ad essa correlate, se si tiene conto sia dei costi per i trattamenti che quelli legati alla perdita di produttività dovuta alle morti premature⁸. Dal momento che questo comportamento si instaura per lo più durante l’adolescenza, la valutazione della diffusione del fenomeno rappresenta un processo indispensabile per riuscire a definire politiche efficaci di salute pubblica volte sia a promuovere una cessazione precoce che, soprattutto per i più giovani, a prevenire l’inizio e l’instaurarsi della dipendenza⁹, in linea anche con quanto indicato a livello internazionale dalla Convenzione Quadro dell’OMS sul controllo del tabacco¹⁰ che stabilisce obiettivi e principi a cui i governi devono adeguarsi.

Tali interventi risultano particolarmente complessi fra i giovani che, nonostante le conseguenze negative note legate al fumo, attribuiscono all’uso di tabacco una funzione sia tipo “regolatoria” del corpo come il controllo dell’umore o del peso, ma anche di tipo relazionale come l’appartenenza al gruppo o la sensazione di maturità e indipendenza¹¹⁻¹². A riguardo già da diversi anni, poiché è stata dimostrata l’inefficacia di interventi basati solo sulla trasmissione di informazioni, si stanno sviluppando programmi finalizzati a sviluppare e rafforzare le competenze dei giovani per fare fronte alle pressioni sociali¹³.

Nelle tabelle 6.1 e 6.2 viene descritta la quota di ragazzi che ha fumato almeno una sigaretta nella propria vita e negli ultimi 30 giorni.

Tabella 6.1 Frequenza del fumo di sigaretta, almeno una sigaretta nella vita, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Mai	96,0	87,5	85,8	90,5
1-2 giorni	2,7	8,2	2,6	4,8
3-5 giorni	1,0	2,1	2,6	1,8
6-9 giorni	0	0,7	1,3	0,5
10-19 giorni	0	0,4	0,6	0,3
20-29 giorni	0	0,4	0,6	0,3
30 giorni o più	0,3	0,7	6,5	1,8

Tabella 6.2 Frequenza del fumo di sigaretta, almeno una sigaretta negli ultimi 30 giorni, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Mai	99,3	97,7	90,4	92,9
1-2 giorni	0,7	1,1	1,9	1,1
3-5 giorni	0	0,4	0	0,1
6-9 giorni	0	0,4	1,3	0,4
10-19 giorni	0	0	0,6	0,1
20-29 giorni	0	0,4	1,9	0,6
30 giorni o più	0	0	3,9	0,8

Si osserva che la maggior parte dei ragazzi intervistati ha dichiarato di non aver “mai” fumato; la percentuale di “non fumatori” si riduce, però, con l’aumentare dell’età, passando dal 96% degli undicenni al 87,5% dei tredicenni sino al 85,8% dei quindicenni]. La % di chi ha fumato ogni giorno negli ultimi 30 giorni è assente negli 11enni e 13 enni E’ bassa nei 15enni ed è superiore nei maschi.

In tabella 6.3 si può capire la differenza di genere e di età per quanto riguarda la quota di ragazzi che dichiarano di fumare ogni giorno negli ultimi 30 giorni.

Tabella 6.3 Frequenza del fumo di sigaretta, ogni giorno negli ultimi 30 giorni, per genere ed età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Maschi	0	0	4,8	1,3
Femmine	0	0	2,0	0,3

ALCOL

Nonostante esista un trend secolare di riduzione del consumo di alcolici¹⁴ ed un aumento del numero di astinenti tra i quindicenni¹⁵, il consumo e l’abuso di alcol fra gli adolescenti è un fenomeno che non può essere sottovalutato anche perché è in questa età che si stabiliscono i modelli di consumo che saranno poi verosimilmente mantenuti nell’età adulta. Sembra infatti esistere un legame tra l’iniziazione in giovane età e l’abuso in età adulta¹⁶. Altri autori considerano invece il consumo di alcol da parte dei giovani una fase del percorso culturale dell’adolescenza, senza che questo diventi necessariamente un problema in grado di segnarli in età adulta¹⁷. Una considerazione da fare è che poiché l’OMS raccomanda la totale astensione dal consumo di alcol fino ai 15 anni e in Italia vige il divieto (Legge 8.11.2012 n.189) di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, il consumo anche di una sola bevanda alcolica da parte di ragazzi minorenni rappresenta un comportamento a rischio nel consumo di alcol. Sebbene l’uso di alcolici sia recentemente diminuito in molti paesi, rimane la sostanza maggiormente utilizzata dai giovani dopo la scuola primaria, rendendo utile monitorarne i consumi, identificare i fattori ad essi associati e stabilire politiche utili a limitarli¹⁸.

Naturalmente tali politiche devono tener conto anche dei cambiamenti che negli ultimi anni si stanno osservando sul consumo di bevande alcoliche. Nel nostro Paese infatti a fronte di una riduzione del consumo di vino durante i pasti, si registra un progressivo aumento di consumo di bevande alcoliche occasionale e al di fuori dei pasti.

Nelle tabelle 6.4 e 6.5 viene descritta la quota di ragazzi che ha bevuto alcol nella propria vita e negli ultimi 30 giorni.

Tabella 6.4 Frequenza del consumo di alcol **nella vita**, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Mai	75,9	65,3	34,1	62,9
1-2 giorni	13,5	15,2	19,4	15,4
3-5 giorni	3,1	8,2	14,2	7,4
6-9 giorni	1,7	4,3	9,7	4,4
10-19 giorni	4,1	2,1	9,0	4,4
20-29 giorni	0	1,4	2,6	1,1
30 giorni o più	1,7	3,5	11,0	4,4

Tabella 6.5 Frequenza del consumo di alcol **negli ultimi 30 giorni**, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Mai	88,9	86,5	58,7	81,6
1-2 giorni	8,0	9,3	28,1	12,8
3-5 giorni	2,2	2,4	9,1	3,7
6-9 giorni	0,3	1,4	2,0	1,1
10-19 giorni	0	0	0,7	0,1
20-29 giorni	0,3	0,4	0,7	0,4
30 giorni o più	0,3	0	0,7	0,3

Si osserva che la maggior parte dei ragazzi intervistati tra gli 11 e i 13 anni ha dichiarato di non aver “mai” bevuto alcol; tale percentuale si riduce, però, con l’aumentare dell’età, passando dal 75,9% degli undicenni al 65,3% dei tredicenni sino al 34,1% dei quindicenni. Negli ultimi 30 giorni non ha mai bevuto alcool l’88,9% degli 11 l’86,5 degli undicenni e il 58,7 dei 15enni. La frequenza negli ultimi 30 giorni è bassa e sembra riguardare maggiormente i maschi.

In Tabella 6.5 bis [in output, word a parte, tabella 6.5 bis “Frequenza di consumo di alcol ogni giorno negli ultimi 30 giorni, per genere ed età] è riportata la frequenza di consumo di alcol quotidiana per genere ed età.

Tabella 6.5 bis Frequenza di consumo di alcol ogni giorno negli ultimi 30 giorni, per genere ed età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Maschi	0,7	0	1,0	0,5
Femmine	0	0	0	0

In tabella 6.6 si ha il dettaglio dei consumi riferiti a specifiche bevande alcoliche.

Tabella 6.6 Frequenza di consumi riferiti a specifiche bevande alcoliche (%)

	Ogni giorno	Ogni settimana	Ogni mese	Raramente/Mai
Birra	0,4	2,6	4,1	92,9
Vino	0,1	2,9	4,0	93,0
Superalcolici	0,1	0,7	3,0	96,2
Alcolpops	0,1	1,6	1,5	96,8
Spritz	0,3	1,5	2,5	95,7
Altra bevanda alcolica	0,1	1,7	3,7	94,5

HBSC ha da sempre indagato anche il fenomeno dell'ubriacatura. In tabella 6.7 si può dunque osservare la frequenza con cui i ragazzi di 11, 13 e 15 anni dichiarano di adottare questo comportamento scorretto.


Tabella 6.7 Frequenza di ubriacatura, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
No, mai	94,2	95,1	81,2	91,8
Si, una volta	4,8	4,2	5,2	4,6
Si, 2-3 volte	0,3	0,7	6,5	1,8
Si, 4-10 volte	0	0	3,2	0,7
Più di 10 volte	0,7	0	3,9	1,1

Il fenomeno dell'ubriacatura aumenta con l'aumentare dell'età anche se sebra un fenomeno in calo nelle rilevazioni precedenti nei 15 enni e nei 13 enni.

Nella figura 6.1 è possibile capire le differenze di genere ed età nella frequenza di ubriacatura; in particolare in coloro che dichiarano di essersi ubriacati 2 volte o più.

Figura 6.1 Frequenza di coloro che dichiarano di essere stati ubriachi 2 volte o più, per età e genere (%)




I maschi soprattutto 15 enni sono più esposti rispetto alle femmine infatti dichiarano di essere stati ubriachi due volte o più (16.2% vs 8%)

Nell'indagine viene indagato anche il Binge Drinking, ovvero il consumo in una sola occasione di oltre 6 Unità Alcoliche (UA = 12 grammi di alcol puro) di una qualsiasi bevanda alcolica, fenomeno che si sta sempre più diffondendo tra i giovani¹⁹⁻²⁰. A riguardo negli ultimi anni per contrastare tale fenomeno si stanno sviluppando strategie comunitarie come la Action plan on youth drinking and on heavy episodic drinking (2014-2016)²¹ con azioni che vanno dalla riduzione dell'accessibilità alle bevande alcoliche e all'esposizione alle pubblicità sull'alcol, ad attività di ricerca e monitoraggio sul tema²².

Nella figura 6.2 è possibile capire le differenze di genere nella frequenza di binge drinking.

Figura 6.2 Frequenza di coloro che dichiarano di aver consumato almeno una volta 5 o più bicchieri di bevande alcoliche in un'unica occasione negli ultimi 12 mesi, per età e genere (%)




I maschi, in percentuale nettamente superiore alle femmine, dichiarano di aver consumato, in un'unica occasione, 5 o più bicchieri di alcol; tale fenomeno aumenta con l'età.

CANNABIS

L'uso di droghe quali la cannabis e, in generale, la sperimentazione di sostanze stupefacenti, sono fra i comportamenti a rischio maggiormente discussi quando si studia lo stato di salute degli adolescenti; questo perché, nonostante gli sforzi compiuti a sostegno delle attività di prevenzione rivolte ai giovani, la diffusione del fenomeno rimane preoccupante²³⁻²⁴. Tale preoccupazione è legata in particolare al dato relativo all'età di inizio dell'uso di sostanze illecite, poiché i dati internazionali mostrano come il diffuso aumento dell'utilizzo di sostanze si accompagni ad un parallelo abbassamento dell'età di iniziazione²³. Nonostante si stia riscontrando come nel caso dell'alcol, una contrazione media nei consumi di cannabis lo studio di questo fenomeno rimane dunque una priorità per la Sanità Pubblica, soprattutto al fine di indirizzare nuove politiche preventive e di controllo.

Nella figura 6.3 è possibile capire le differenze di genere nella frequenza di quindicenni che consumano cannabis.

Figura 6.3 Frequenza dei quindicenni che hanno fumato cannabis, per genere (%)




9 ragazzi su 10 non consumano cannabis e solamente una piccola percentuale (2,9 dei maschi%) ha dichiarato di fumare cannabis 30 giorni o più;

GIOCO D'AZZARDO

Nel corso degli ultimi anni la diffusione del gioco d'azzardo fra gli adolescenti è stata riconosciuta come un'importante tematica di salute pubblica e un campo emergente di ricerca²⁵⁻²⁶. Gli adolescenti sono considerati un gruppo ad alto rischio di sviluppo di problemi correlati al gioco d'azzardo perché tendono a sottostimare i rischi legati al gioco e spesso falliscono nel richiedere forme di aiuto o di assistenza per problemi di gioco²⁷. Come accade per gli adulti, anche in questa fascia di età la letteratura indica come quest'abitudine possa portare a diverse conseguenze negative, come per

esempio comportamenti criminali, difficoltà scolastiche, compromissione delle relazioni sociali (per es. con genitori e amici), abuso di sostanze, depressione e persino suicidio²⁸. D'altra parte il gioco d'azzardo è diventato ormai, nonostante i divieti previsti per legge, una popolare forma di svago fra gli adolescenti, tanto che dei recenti dati su 33 Stati Europei dimostrano come il 23% degli studenti ha dichiarato di aver giocato d'azzardo nell'ultimo anno (32% dei ragazzi vs 14% ragazze)²⁵. Diverse ricerche sono state condotte allo scopo di capire quali fattori e in che modo essi agiscano sull'inizio, lo sviluppo e la cronicizzazione del problema del gioco d'azzardo fra i più giovani. Ulteriori studi sono tuttavia necessari per comprendere meglio il ruolo di aspetti legati alla società, variabili socio-economiche e dei media nell'influenzare valori, credenze e comportamenti rispetto a questo vizio. Le domande sul gioco d'azzardo inserite per la prima volta nell'indagine HBSC Italia del 2014 (e riproposte nella rilevazione 2018) sono volte ad indagare sia l'esperienza dei ragazzi con scommesse e puntate di denaro nel corso della vita, che a valutare il loro grado di 'coinvolgimento' riuscendo ad individuare la quota di ragazzi 'a rischio' di sviluppare problemi di gioco e quelli che già presentano 'seri problemi'. Nell'ambito dell'indagine HBSC 2018 è stato chiesto ai ragazzi di 15 anni di indicare se hanno mai scommesso e/o giocato denaro nella loro vita. Nella figura 6.4 si riporta tale informazione per genere.


Figura 6.4 Frequenza di quindicenni che hanno scommesso denaro, per genere (%)



La figura 6.5 mostra la percentuale di quindicenni con gioco d'azzardo a rischio e problematico.

Oltre il 40% dei maschi 15enni ha dichiarato di avere scommesso denaro. Nella fig.6.5 gli intervistati dichiarano che la scommessa non è problematico. Questa sottovalutazione del rischio di dipendenza va però tenuta sotto controllo. Il confronto tra maschi e femmine per quanto riguarda i comportamenti a rischio e problematico legati al gioco d'azzardo evidenzia anche in questo caso frequenze maggiori nei maschi.

Figura 6.5 Frequenza di quindicenni con gioco d'azzardo a rischio/problematico, per genere (%)



CONCLUSIONI

La percentuale di chi non fuma è molto elevata essendo per 11enni pari a 99,3% e nei 13enni 97,9%, mentre nei 15enni è del 90,3%. Questo dato dei 15enni è leggermente diminuito rispetto alla rilevazione precedente del 2014. ,

In totale l' 88,6% degli adolescenti dichiarano di non aver "mai" utilizzato cannabis. Tale percentuale è maggiore nelle femmine rispetto ai maschi.

Per quanto riguarda la frequenza del consumo di alcol la percentuale di coloro che dichiarano di non consumare "Mai" alcolici diminuisce all'aumentare dell'età, infatti si riscontrano differenze apprezzabili solo nei giovani di 15 anni. In lieve aumento rispetto al passato la percentuale di 15enni che non bevono "Mai".

Diminuisce, anche se di poco, la frequenza di coloro che affermano di non essersi mai ubriacati. Nel caso dell'ubriacatura non si riscontrano differenze apprezzabili tra maschi e femmine. Nel consumo in una sola occasione di più unità alcoliche (Binge Drinking) sono soprattutto i 15enni e più i maschi che le femmine a dichiarare di aver consumato 5 o più bicchieri di alcol in un'unica occasione

Per quello che riguarda la diffusione del gioco d'azzardo è diminuito tra le femmine mentre è aumentato tra i maschi. Così come è aumentata anche la rischiosità di tale comportamento in entrambe le componenti. Va rilevato che oltre il 90% degli intervistati dichiara questo comportamento non problematico. Tale situazione richiederà una particolare attenzione.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ¹Nationa Institute on Drug abuse: <https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/>
- ²Gogtay N, Giedd JN, Lusk L, Hayashi KM, Greenstein D, Vaituzis AC, et al. (2004): Dynamic mapping of human cortical development during childhood through early adulthood. *Proc Natl Acad Sci U S A* 101:8174–8179.
- ³Oliveira LMFT, Santos ARMD, Farah BQ, Ritti-Dias RM, Freitas CMSM, Diniz PRB. Influence of parental smoking on the use of alcohol and illicit drugs among adolescents. *Einstein (Sao Paulo)*. 2019 Jan 14;17(1):eAO4377.
- ⁴Thomas RE, Baker PRA, Thomas BC. Family-Based Interventions in Preventing Children and Adolescents from Using Tobacco: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Acad Pediatr*. 2016 Jul;16(5):419-429.
- ⁵Sussman, S.; Skara, S.; and Ames, S.L. Substance abuse among adolescents. *Substance Use & Misuse* 43(12–13):1802–1828, 2008.
- ⁶Mokdad AH, Forouzanfar MH, Daoud F, Mokdad AA, et al.,. Global burden of diseases, injuries, and risk factors for young people's health during 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *Lancet*. 2016;387(10036):2383-401.
- ⁷GBD 2013 Risk Factors Collaborators, Forouzanfar MH, Alexander L, Anderson HR, Bachman VF, et al., Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *Lancet*. 2015;386(10010):2287-323.
- ⁸WHO report on the global tobacco epidemic 2019. https://www.who.int/tobacco/global_report/en/
- ⁹Cavallo F., Lemma P., Santinello M., Giacchi M. (a cura di) (2007), *Stili di vita e salute dei giovani italiani tra 11-15 anni*. Il Rapporto sui dati italiani dello studio internazionale HBSC. Padova: Cleup.
- ¹⁰Framework Convention on Tobacco Control – FCTC. <https://www.who.int/fctc/en/>
- ¹¹Audrain-McGovern J., Rodriguez D., Rodgers K., Cuevas J., Sass J., Riley T.(2012). Reward expectations lead to smoking uptake among depressed adolescents. *Drug and Alcohol Dependence*, 120: 181-189.
- ¹²Lambert M., Verduyck P., Van den Broucke S. (2002). Summary on the literature on young people, gender and smoking. In: Lambert M, Hublet A, Verduyck P, Maes L, Van den Broucke S. Gender differences in smoking in young people. Brussels, Belgium: Flemish Institute for Health Promotion.
- ¹³Hwang MS, Yeagley KL, Petosa R. A meta-analysis of adolescent psychosocial smoking prevention programs published between 1978 and 1997 in the United States. *Health Educ Behav*. 2004;31(6):702-19.
- ¹⁴Looze Md, Raaijmakers Q, Bogt TT, Bendtsen P, Farhat T, Ferreira M, Godeau E, Kuntsche E, Molcho M, Pfortner TK, Simons-Morton B, Vieno A, Vollebergh W, Pickett W. Decreases in adolescent weekly alcohol use in Europe and North America: evidence from 28 countries from 2002 to 2010. *Eur J Public Health*. 2015 ;25 Suppl 2:69-72.
- ¹⁵Vieno A, Altoè G, Kuntsche E, Elgar FJ. Do public expenditures on health and families relate to alcohol abstaining in adolescents? Multilevel study of adolescents in 24 countries. *Drug Alcohol Rev*. 2018;37 Suppl 1:S120-S128. ¹⁶Poikolainen K., Tuulio-Henriksson A., Aalto-Setäläet T., Marttunen M., Lönnqvist J. (2001). Predictors of alcohol intake and heavy drinking in early adulthood: a 5-year follow-up of 15-19 year-old Finnish adolescents. *Alcohol and alcoholism*, 36: 85-88.
- ¹⁷Engels R.C., Scholte R.H., Van Lieshout C.F., De Kemp R., Overbeek G.J. (2006). Peer group reputation and smoking and alcohol consumption in early adolescence. *Addictive Behaviors*, 31: 440–449.
- ¹⁸Jo Inchley, Dorothy Currie, Alessio Vieno, Torbjørn Torsheim, Carina Ferreira-Borges, Martin M. Weber, Vivian Barnekow & João Breda. Adolescent alcohol-related behaviours: trends and inequalities in the WHO European Region, 2002–2014.
- ¹⁹National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. *Drinking Levels Defined*. Available from: <https://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/overview-alcohol-consumption/moderate-binge-drinking>.
- ²⁰M. Stolle, PM. Sack e R. Thomasius, Binge drinking in childhood and adolescence: epidemiology, consequences, and interventions., in *Dtsch Arztebl Int*, vol. 106, n° 19, maggio 2009, pp. 323–8.
- ²¹Action Plan on Youth Drinking and on Heavy Episodic Drinking (Binge Drinking) (2014-2016). https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/alcohol/docs/2014_2016_actionplan_youthdrinking_en.pdf
- ²²Scafato E, Ghirini S, Gandin C, Vichi M, Scipione R e il gruppo di lavoro CSDA (Centro Servizi Documentazione Alcol). *Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell'Osservatorio Nazionale Alcol sull'impatto del consumo di alcol ai fini dell'implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute. Rapporto 2018*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2018. (Rapporti ISTISAN 18/2).
- ²³Fink DS. Commentary on Burdzovic Andreas & Bretteville-Jensen (2017): Cannabis use opportunities-an under-researched factor in substance use epidemiology. *Addiction*. 2017;112(11):1983-1984.
- ²⁴Burdzovic Andreas J, Bretteville-Jensen AL. Ready, willing, and able: the role of cannabis use opportunities in understanding adolescent cannabis use. *Addiction*. 2017;112(11):1973-1982.
- ²⁵Molinaro S, Benedetti E, Scalese M, Bastiani L, Fortunato L, Cerrai S, Canale N, Chomynova P, Elekes Z, Feijão F, Fotiou A, Kokkevi A, Kraus L, Rupšienė L, Monshouwer K, Nociar A, Strizek J, Urdih Lazar T. Prevalence of youth gambling and potential influence of substance use and other risk factors throughout 33 European countries: first results from the 2015 ESPAD study. *Addiction*. 2018;113(10):1862-1873.
- ²⁶Calado F, Alexandre J, Griffiths MD. Prevalence of Adolescent Problem Gambling: A Systematic Review of Recent Research. *J Gambl Stud*. 2017;33(2):397-424.

²⁷Canale N, Vieno A, Ter Bogt T, Pastore M, Siciliano V, Molinaro S. Adolescent Gambling-Oriented Attitudes Mediate the Relationship Between Perceived Parental Knowledge and Adolescent Gambling: Implications for Prevention. *Prev Sci.* 2016;17(8):970-980.

²⁸Blinn-Pike L, Worthy SL, Jonkman JN. Adolescent gambling: a review of an emerging field of research. *J Adolesc Health.* 2010;47(3):223-36

7. SALUTE E BENESSERE

INTRODUZIONE

La salute consente all'uomo di raggiungere e soddisfare i propri obiettivi di vita e, nella definizione positiva proposta dall'OMS, si rappresenta come un capitale che al fianco di quelle fisiche riconosce altre categorie di risorse individuali e sociali, permettendo così agli individui di essere attivi nei normali contesti di vita e di lavoro¹⁻³. Il benessere può invece essere definito come una condizione di equilibrio in cui l'individuo percepisce di avere le risorse fisiche, psicologiche e sociali di cui ha bisogno per rispondere alle sfide che la vita gli propone. In assenza di questo equilibrio il soggetto tende a percepire una condizione di ansia che si può accompagnare a sintomi di stress quali i disturbi del sonno o il mal di stomaco fino ad arrivare alla depressione. Ogni soggetto è quindi portatore di risorse interne (potenzialità fisiche, psicologiche, cognitive, ecc.) che sono però in continua interazione con le risorse presenti nei diversi livelli del sistema ecologico del quale si trova a far parte, attraverso dinamiche complesse che rispondono al principio della causalità reciproca. Accettare questa impostazione richiede che nell'interrogarsi sulla salute di una popolazione non ci si concentri più sui soli fattori di rischio delle malattie ma si ampli l'orizzonte di osservazione, cercando quindi di mettere a fuoco le diverse "risorse" di cui il soggetto ha bisogno, non solo per rispondere alle necessità di tipo fisiologico ma anche a quelle di tipo culturale, sociale e di altro tipo ancora: risorse che rappresentano una sorta di capitale sul quale fondare la propria salute⁴.

Valutare la salute a livello di popolazione non è certo compito di facile esecuzione⁵ e ancora più complesso può apparire quello di definire e monitorare la salute dei giovani in età adolescenziale: è in questa fascia di età che troviamo i tassi di mortalità e morbosità più bassi che nel resto dell'arco della vita ma è anche questa l'età in cui gli aspetti relazionali e di contesto di vita cominciano a giocare un ruolo fondamentale dimostrandosi in grado di determinare la condizione di salute del futuro adulto²⁻³. Quest'influenza, già nota per i principali fattori di rischio - come una scorretta alimentazione, il sovrappeso-obesità o la presenza di comportamenti e abitudini voluttuarie nei confronti delle patologie cardio-vascolari o tumorali - risulta evidente anche per alcune tra quelle che prima sono state definite come risorse dell'ambiente ecologico del soggetto rispetto a condizioni su cui si accentra una sempre maggiore attenzione: l'ansia, la depressione e la nevrosi⁶.

In questo contesto lo studio HBSC offre l'opportunità di monitorare alcune delle variabili più importanti e utili a descrivere questo momento definito come centrale nello sviluppo dell'individuo, basandosi sull'auto-percezione dei ragazzi del proprio stato di salute e del proprio benessere nei diversi ambiti della loro vita, più che sulla frequenza di malattia. Le variabili utilizzate come descrittori dello stato di salute e del benessere psico-fisico sono raccolte in quattro macro categorie:

- a) Percezione del proprio stato di salute (eccellente, buono, discreto, scadente);
- b) Percezione del proprio benessere (valutato su una scala da 0 a 10);
- c) Presenza e frequenza (ogni giorno, più di una volta a settimana, una volta a settimana, una volta al mese, raramente o mai) di alcuni sintomi che sembrano essere importanti indicatori di benessere/malessere, e che verranno descritti all'interno di questo capitolo;

d) Consumo di farmaci (nessun farmaco nell'ultimo mese, un farmaco o più di un farmaco nell'ultimo mese).

In questo capitolo si riporta, inoltre, una sezione relativa alla salute sessuale, alla frequenza di infortuni e al rapporto tra pari.

SALUTE PERCEPITA

Lo studio HBSC come si è detto precedentemente rivolge la propria attenzione ad una popolazione prevalentemente sana che, sotto il profilo epidemiologico, presenta livelli molto bassi sia di morbosità che di mortalità. Questi ultimi indicatori, appropriati per descrivere il profilo di salute di una comunità nel suo complesso, hanno una ridotta capacità descrittiva in questa particolare fascia di età per la quale è invece più appropriato affidarsi alla percezione soggettiva del proprio stato di salute⁷. Studi recenti condotti nella popolazione adulta hanno dimostrato che percepire la propria salute come meno buona sia effettivamente correlato ad una ridotta aspettativa di vita e hanno descritto una chiara relazione tra la salute percepita e quella misurata dai professionisti della sanità⁶⁻⁷. Sembra quindi che chiedere direttamente a una persona come si senta sia un modo affidabile per conoscere la sua condizione di salute. Anche per gli adolescenti la percezione dello stato di salute presenta un andamento coerente con la presenza/assenza di sintomi di ansietà e depressione⁸ con il successo/insuccesso scolastico e con il vivere positivamente o meno l'esperienza scolastica e la qualità della comunicazione con i genitori⁹.

Nella tabella 7.1 sono riportate le frequenze percentuali relative alla valutazione del proprio stato di salute, per classe di età.


Tabella 7.1 "Diresti che la tua salute è..., per età" (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Eccellente	41,3	32,5	21,9	33,8
Buona	51,0	57,4	66,5	56,7
Discreta	7,0	10,1	11,6	9,2
Scadente	0,7	0	0	0,3

Dai dati in tabella si evince che circa il 90% dei ragazzi considera il suo stato di salute eccellente e buono. Considerando le diverse classi di età, emerge una percezione positiva del proprio stato di salute negli 11enni

Nella Figura 7 sono riportate differenze tra maschi e femmine riguardo al giudizio "buona o eccellente" sul proprio stato di salute, per classe di età.

Figura 7.1 Frequenza di ragazzi che considerano la propria salute buona o eccellente, per età e genere (%)



Il giudizio positivo circa la propria salute diminuisce all'aumentare dell'età e risente di lievi differenze di genere i maschi dichiarano una buona salute in percentuali lievemente maggiori.

BENESSERE PERCEPITO

Un buono stato di salute è caratterizzato non solo dall'assenza di malattia ma anche dalla presenza di benessere, di cui la valutazione positiva di soddisfazione per la propria vita è considerato un importante aspetto^{6,9}. Tra gli adolescenti un alto livello di soddisfazione per la propria vita si è dimostrato, infatti, associato al mancato uso di sostanze¹⁰ e a più alti livelli di attività fisica¹¹. Lo studio HBSC, per descrivere il benessere percepito, chiede ai ragazzi di dichiarare in quale posizione, su una scala tra 0 e 10, porrebbero il loro grado di soddisfazione per la vita: tale tecnica di misurazione (denominata scala di Cantril) si è rivelata efficace sia negli adulti che nei ragazzi¹².

Il giudizio espresso dai ragazzi riguardo alla percezione del proprio benessere è riportato in tabella 7.2 con raggruppamenti da 0 a 5 e maggiore/uguale a 6. Le percentuali riguardano i ragazzi di 11, 13 e 15 anni.

Tabella 7.2 "In generale, su che gradino della scala senti di trovarti in questo momento da 0 (= La peggior vita possibile) a 10 (= La miglior vita possibile)", per età (%)


	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
0-5	12,5	13,9	7,7	11,9
≥6	87,5	86,1	92,3	88,1

In generale l'88% ha una percezione positiva del proprio benessere.

Il confronto tra le diverse classi di età mostra differenze nella percezione del proprio benessere. Un giudizio più positivo dai maschi 15 enni.

Nella Figura 7.2 le percentuali di percezione del benessere da parte dei ragazzi vengono distinte tra maschi e femmine con raggruppamenti 0-5 e ≥ 6 .

Figura 7.2 Frequenza del benessere misurato su scala da 0 (= La peggior vita possibile) a 10 (= La miglior vita possibile) con raggruppamenti 0-5 e ≥ 6 , per genere (%)



Il confronto tra maschi e femmine evidenzia lievi differenze con più basse percentuali di punteggio positivo (≥ 6) nelle femmine (85,6% contro 90% dei maschi) .

SINTOMI RIPORTATI

Nello studiare la salute degli adolescenti è importante indagare la complessità dei fattori che sostengono la percezione che loro stessi hanno della condizione riferita interrogandoli, ad esempio, sui sintomi di cui dichiarano di soffrire, anche e soprattutto in assenza di una diagnosi di malattia. L'esperienza soggettiva di sintomi, infatti, oltre che ad un maggior uso di farmaci e di servizi sanitari¹³, si dimostra anche associata ad un basso successo e a negative esperienze scolastiche¹⁴, tra le quali ritroviamo il bullismo attivo e subitico e le cattive relazioni con i pari¹⁵. Tale quadro, confermato anche dall'uso di più sofisticate tecniche di analisi, sembra suggerire una relazione tra il riportare specifici sintomi di origine psicosomatica e situazioni di stress¹⁰. Lo studio HBSC esplora questa dimensione chiedendo ai ragazzi la frequenza con cui soffrono di uno dei seguenti otto sintomi: mal di testa, mal di stomaco, mal di schiena, difficoltà ad addormentarsi, giramenti di testa, sentirsi giù di morale, sentirsi irritabili o di cattivo umore, sentirsi nervoso. L'uso di tale lista è stato sottoposto ad una validazione quali-quantitativa che ha permesso di verificare che i ragazzi posseggono le capacità cognitive che permettono loro di comprendere e differenziare i concetti sui quali vengono interrogati e affidabilità nel valutare e riportare i sintomi¹⁵.

La tabella 7.3 riporta le frequenze percentuali riferite alle tre classi di età (11, 13 e 15 anni) dei sintomi legati ai disturbi fisici, umorali e comportamentali avuti negli ultimi sei mesi.

Tabella 7.3 “Negli ultimi sei mesi: quante volte hai avuto (o ti sei sentito) uno dei seguenti sintomi: avere mal di testa, avere mal di stomaco, avere mal di schiena, sentirsi giù, sentirsi irritabile o di cattivo umore, sentirsi nervoso, avere difficoltà ad addormentarsi, avere senso di vertigini”, per età (%)


	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Circa ogni giorno	27,1	22,1	18,7	23,4
Più di una volta a settimana	24,7	28,4	25,2	26,3
Circa una volta a settimana	17,1	19,2	21,3	18,7
Circa una volta al mese	19,1	21,0	27,1	21,5
Raramente o mai	12,0	9,3	7,7	10,1

Solo circa il 10% dichiara di non avere mai o raramente i sintomi citati le percentuali riscontrate evidenziano particolari differenze tra le varie classi di età in particolare per i quindicenni con cui la percentuale si abbassa a circa all'8%.

Precedenti studi hanno considerato questi sintomi come suddivisibili in due categorie distinte¹⁵⁻¹⁶: una che comprende sintomi a prevalente componente somatica (l'aver mal di testa, mal di stomaco, mal di schiena, difficoltà ad addormentarsi e senso di vertigini), e l'altra che comprende sintomi a prevalente componente psicologica (sentirsi giù, irritabile e nervoso).


Le Figure 7.3 e 7.4 evidenziano, rispettivamente, le frequenze di sintomi somatici e psicologici avvertiti dai ragazzi (maschi, femmine e totale) quotidianamente.

Figura 7.3 Frequenze di coloro che dichiarano di soffrire ogni giorno di almeno un sintomo tra: mal di testa, mal di stomaco, mal di schiena, difficoltà ad addormentarsi, senso di vertigini, per genere (%)



Il sintomo maggiormente riferito è l'insonnia con una percentuale di 12,6% nettamente più presente per le femmine con 17,1%.

Figura 7.4 Frequenza di coloro che dichiarano di soffrire ogni giorno di almeno un sintomo tra sentirsi giù, irritabile e nervoso, per genere (%)



il sintomo maggiormente riferito è nervoso con una percentuale di 10,8% che nelle femmine raggiunge 16,9% così come il sintomo “giu di morale”.

UTILIZZO DI FARMACI

Come si diceva nella sezione precedente, l’esperienza soggettiva di sintomi è un indicatore di salute che spesso si associa ad un maggior uso di farmaci e di servizi sanitari¹³. Nella popolazione adolescente l’analisi dell’uso di farmaci è relativamente nuova, introdotta infatti per la prima volta nel report 2010¹⁷. Nell’indagare questo comportamento viene chiesto ai ragazzi il ricorso, nell’ultimo mese (mai, una volta, più di una volta) a farmaci per alcuni specifici disturbi: mal di testa, mal di stomaco, difficoltà ad addormentarsi, nervosismo, altro. Nella Tabella 7.4 si rileva che gli undicenni prendono in percentuale più farmaci rispetto alle altre classi di età (61,1%)

Tabella 7.4 “Nell’ultimo mese hai preso medicine o farmaci (per almeno un sintomo)?”, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
No	39,9	45,4	50,3	44,2
Si	61,1	54,6	49,7	55,8

ABITUDINI SESSUALI

Il questionario HBSC rivolto ai ragazzi quindicenni contiene una breve sezione riguardante le abitudini sessuali e il tipo di contraccettivo utilizzato durante il rapporto sessuale. La tabella 7.5 mostra la frequenza di quindicenni che dichiarano di aver avuto rapporti sessuali completi.

Tabella 7.5 Frequenze di ragazzi quindicenni che dichiarano di aver avuto rapporti sessuali completi, per genere (%)

	Maschi (%)	Femmine (%)	Totale (%)
Si	25,7	18,0	23,2
No	74,3	82,0	76,8

Come si rileva dalla tabella 6.8 il 23,2% dei quindicenni dichiara di aver avuto rapporti sessuali completi; i maschi in percentuale maggiore delle femmine.

La tabella 7.6 analizza per i quindicenni e per genere le frequenze percentuali di utilizzo, nell'ultimo rapporto sessuale, di metodi contraccettivi quali preservativo, pillola, coito interrotto e altri tipi di contraccettivi. La domanda è stata posta solo a coloro che avevano dichiarato di avere avuto rapporti sessuali completi.

Tabella 7.6 Frequenze percentuali del tipo di metodo contraccettivo utilizzato nell'ultimo rapporto sessuale, per genere (%)

	Maschi (%)	Femmine (%)	Totale (%)
Preservativo	48,3	33,3	44,7
Pillola	17,2	11,1	15,8
Coito interrotto	20,7	22,2	21,1
Altri metodi	3,4	12,5	5,4

In generale il metodo maggiormente utilizzato è il preservativo seguito dal coito interrotto.

INFORTUNI

Ai ragazzi è stato chiesto il numero delle volte che, negli ultimi dodici mesi, hanno avuto infortuni per i quali è stato necessario un intervento da parte di personale medico o infermieristico. Nella tabella 7.7 sono riportate le frequenze percentuali relative a tali infortuni per i ragazzi di 11, 13 e 15 anni. In generale il 43,4% dei ragazzi dichiara di non aver avuto infortuni negli ultimi 12 mesi che abbiano richiesto cure mediche.

Tabella 7.7 "Negli ultimi 12 mesi, quante volte hai avuto infortuni per i quali hai dovuto ricorrere alle cure di un medico o di un/a infermiera?", per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Non negli ultimi 12 mesi	40,1	43,8	48,2	43,4
Una volta	31,8	28,3	26,6	29,3
Due volte	13,9	14,1	12,3	13,6
Tre volte	4,1	7,8	7,1	6,1
Quattro volte e più	10,1	6,0	5,8	7,6

RAPPORTO TRA PARI

Per indagare il rapporto dei ragazzi con i propri pari, sono state elaborate alcune domande volte ad identificare il sostegno che i ragazzi ricevono dalla propria rete di coetanei. In tabella 7.8 è possibile capire quanto riportato dai ragazzi. La rete di supporto dai propri coetanei è molto forte in tutte le fasce di età. Infatti in ogni fascia di età oltre il 70% concorda con l'affermazione "Posso davvero parlare dei miei problemi con i miei amici"

Tabella 7.8 Frequenza di ragazzi che dichiarano di essere "abbastanza d'accordo", "d'accordo" o "molto d'accordo" con le quattro affermazioni..., per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
I miei amici provano ad aiutarmi	77,2	72,6	72,9	74,5
Posso contare sui miei amici quando le cose vanno male	76,9	75,4	73,5	76,6
Ho amici con cui condividere gioie e dispiaceri	88,5	86,0	82,0	86,2
Posso davvero parlare dei miei problemi con i miei amici	75,3	74,8	70,3	74

CONCLUSIONI

Lo stato di salute e il benessere psicofisico dei giovani è stato indagato attraverso l'auto-percezione sulle diverse variabili indagate. I dati autoriferiti ci mostrano che 1 giovane su 10, definisce la propria salute discreta/scadente mentre circa 3 ragazzi su 10, definiscono il loro stato di salute eccellente. Solo il 21% dei 15enni la dichiara eccellente. Particolare attenzione va posta sul fatto che rispetto le rilevazioni precedenti soprattutto il 2010 sia i 13enni che i 15enni hanno dichiarato di avere una salute migliore.

Le ragazze in generale tendono a percepire la propria salute in maniera meno positiva e con più sintomi dichiarati rispetto ai ragazzi, questa differenza aumenta con l'aumentare dell'età mentre per i maschi si osserva l'esatto contrario.

Per quel che riguarda il benessere percepito tra i 15enni hanno una percezione di vita possibile migliorata e questa percezione è superiore rispetto agli 11enni e ai 13enni.

Ogni giorno il 23% degli intervistati dichiara di aver avuto sintomi a componente somatica oppure psicologica tutti i giorni. Le femmine in generale riferiscono di avere questi sintomi con una frequenza maggiore rispetto ai maschi.

Solo il 44,2% degli intervistati ha riferito di non aver utilizzato alcun farmaco nell'ultimo mese precedente l'indagine, in flessione rispetto al 2014 (60%).

E' aumentata la percentuale dei 15enni che hanno avuto rapporti sessuali soprattutto tra i maschi, cala però l'utilizzo dei dispositivi di protezione.

I giovani sammarinesi riguardo al rapporto tra pari dimostrano un'elevata capacità di relazionarsi con i coetanei.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ¹Herzlich C. (1973). Health and illness. London: Academic Press.
- ²World Health Organization (1998). Health promotion glossary. Geneva, WHO.
- ³Baum, F., Lawless, A., Williams, C. (2013). Health in All Policies from international ideas to local implementation: policies, systems and organizations. Health promotion and the policy process: practical and critical theories. Oxford: Oxford University Press.
- ⁴P. Lemma. Promuovere salute. Principi e strategie. Il pensiero scientifico, 2018.
- ⁵Rashad, H., Khadr, Z. (2014). Measurement of health equity as a driver for impacting policies. Health Promotion International, 29:i68-i82.
- ⁶Friedman, HS., Kern, ML. (2014). Personality, Well-Being, and Health. Annual Review of Psychology, 65:719-742.
- ⁷Bowling, A. (2014). Research methods in health. New York, McGraw-Hill Education.
- ⁸de Matos M.G., Barrett P., Dadds M., Shortt A. (2003). Anxiety, depression and peer relationships during adolescence: results from the Portuguese National Health Behaviour in School-aged Children survey. European Journal of Psychology of Education, 18:3-14.
- ⁹Ravens-Sieberer U., Kokonyei G., Thomas C. School and health (2004). In: Currie C, Roberts C, Morgan A. Smith R., Settertobulte W., Samdal O., Barnekov Rasmussen V. (Ed.). Young people's health in context: international report from the HBSC 2001/2002 survey. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
- ¹⁰Lemma, P., Borraccino, A., Berchiolla, P., Dalmasso, P., Charrier, L., Vieno, A., Lazzeri G, Cavallo, F. (2014). Well-being in 15-year-old adolescents: a matter of relationship with school. Journal of Public Health.
- ¹¹Thome J., Espelage D.L. (2004) Relations among exercise, coping, disordered eating and psychological health among college students. Eating Behaviors, 5:337-51.
- ¹²Cantril H. (1965). The pattern of human concern. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- ¹³Belmaker E (1985). Use of medical services by adolescents with non-specific somatic symptoms. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 1:1-2.
- ¹⁴Torsheim T., Wold B. (2001). School-related stress, school support, and somatic complaints: a general population study. Journal of Adolescence Research, 16:293-303.
- ¹⁵Haugland S., Wold B. (2001a). Subjective health complaints in adolescence – Reliability and validity of survey methods. Journal of Adolescence, 24:611-24.
- ¹⁶Haugland S., Wold B., Stevenson J., Aarø L.E., Woynarowska B. (2001b). Subjective health complaints in adolescence – a cross-national comparison of prevalence and dimensionality. European Journal of Public Health, 11:4-10.
- ¹⁷Cavallo, F., Giacchi, M., Vieno, A., Galeone, D., Lamberti, A., Nardone, P., Andreozzi, S. (2013). Studio HBSC-Italia (Health Behaviour in School-aged Children): rapporto sui dati 2010. Rome: Istituto Superiore di Sanità.

8. 1 SOCIAL MEDIA

INTRODUZIONE

Nell'ultimo decennio, l'uso delle nuove tecnologie è diventato sempre più diffuso e importante soprattutto tra (pre)adolescenti e giovani in tutto il mondo. Infatti, per la maggior parte degli adolescenti europei e nordamericani, internet è disponibile 24 ore su 24 e, quindi, utilizzato per moltissimi motivi diversi: giocare ai videogiochi online, ricercare informazioni, passare il tempo e stabilire e mantenere relazioni con gli altri attraverso l'uso dei social network¹. La letteratura scientifica sul tema dell'uso dei social media tra i più giovani indica che, quando limitato e responsabile, tale uso può avere un impatto positivo sul benessere dei ragazzi in termini di maggiore percezione di supporto sociale, connessione con i pari e impegno civico²⁻⁴. D'altra parte, studi recenti hanno mostrato che un uso eccessivo e/o problematico delle nuove tecnologie può avere ripercussioni sulla salute psico-fisica dei più giovani in termini di maggiori livelli di ansia, depressione e sintomi fisici^{5,6}. In questo senso, sebbene la ricerca in questo ambito stia procedendo velocemente, l'analisi delle motivazioni, dei benefici e dei rischi che i ragazzi incontrano sui social media è attualmente riconosciuta come fondamentale a livello nazionale e internazionale.

L'USO DEI SOCIAL MEDIA

Per quanto riguarda i possibili benefici e rischi in termini di connessione sociale, lo studio HBSC rileva la frequenza con cui i ragazzi hanno contatti online con i loro amici, con amici di un gruppo allargato, con altre persone (es. familiari, compagni di classe, insegnanti) e con persone conosciute online. In tabella 8.1 sono riportate le risposte dei ragazzi.

Tabella 8.1 "Quante volte hai contatti online giornalieri o più volte al giorno con le seguenti persone", per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
Amici stretti	72,7	82,8	85,29	79,2
Amici di un gruppo allargato	60,6	56,1	59,5	58,7
Amici conosciuti tramite internet	11,6	15,1	14,9	13,6
Altre persone, non amici (esempio genitori, fratelli/sorelle, ecc.)	54,3	48,0	64,5	54,1

I contatti on-line giornalieri riguardano soprattutto gli amici stretti per tutte le fasce di età mentre circa metà degli intervistati hanno contatti on-line anche con altre persone non amici (es. Familiari) in questa categoria spiccano i 15 enni con il 64,5%.

Il 16,1% dei ragazzi e il 18,2% delle ragazze hanno dichiarato di avere contatti con amici. La maggioranza delle ragazze (84,8%) e dei ragazzi (72,7%) ha dichiarato di avere contatti giornalmente o più volte al giorno con la cerchia di amici stretti che frequentano anche faccia a faccia. I ragazzi 11enni rappresentano il gruppo che sembra utilizzare i social meno frequentemente degli altri per questo scopo (62,5%).

La voce relativa alle conoscenze tramite internet sembra invece un fenomeno ancora limitato(13,6%) anche se interagire con persone conosciute esclusivamente on-line può costituire un fattore di rischio per fenomeni quali l'adescamento di minori. Il 16,1% dei ragazzi e il 18,2% delle ragazze hanno dichiarato di avere contatti con amici on-line che non conoscevano prima, giornalmente o più volte al giorno. Questo comportamento sembra maggiormente diffuso tra i ragazzi e le ragazze 13enni (rispettivamente 19% e 22.1%).

Nell'indagine HBSC 2018 sono state, inoltre, inserite per la prima volta alcune domande relative all'uso problematico dei social media con lo scopo di evidenziare la diffusione attuale di un fenomeno che sembra in continuo divenire. Nello specifico, ai ragazzi è stato chiesto di rispondere ad alcune domande volte ad indagare una motivazione negativa all'uso dei social: la preferenza per le interazioni sociali online rispetto a quelle faccia a faccia^{7,8}. In tabella 8.2 sono riportate le risposte dei ragazzi.


Tabella 8.2 Frequenza di ragazzi che sono d'accordo e molto d'accordo con le affermazioni:, per età (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
<i>“Su internet parlo più facilmente dei miei segreti, piuttosto che faccia a faccia”</i>	12,0	12,2	10,6	11,8
<i>“Su internet parlo più facilmente dei miei sentimenti più profondi piuttosto che in un incontro faccia a faccia”</i>	15,6	21,4	15,2	17,7
<i>“Su internet parlo più facilmente delle mie preoccupazioni piuttosto che in un incontro faccia a faccia”</i>	11,7	13,6	15,2	13,2

Il 17,7% dei ragazzi dichiara “parlo più facilmente dei miei sentimenti più profondi piuttosto che in un incontro faccia a faccia” su internet soprattutto i 13 enni (21,4%).

Inoltre, gli indicatori della Social Media Disorder Scale⁹ offrono una panoramica dei sintomi più frequenti dell'uso problematico dei social media. In questo modo è possibile osservare la prevalenza di ragazzi a rischio di sviluppare una problematicità legata dell'uso dei social media (cioè i ragazzi che hanno dichiarato di riconoscersi in 6 o più sintomi), figura 8.1

Figura 8.1 Frequenza di ragazzi che fanno uso problematico dei social media, per età e genere (%)



In generale la percentuale di chi fa un uso problematico dei social media è abbastanza bassa intorno all'8%. Considerando fasce di età e sesso è maggiormente elevato per le femmine tredicenni che raggiungono il 14,5%.


La novità del tema "Uso problematico dei social media" ci porta ad approfondire alcuni aspetti dato che associato ad esso si riscontrano alcuni sintomi delle dipendenze tradizionali ed altre caratteristiche specifiche quali la preferenza per le interazioni on-line. I 9 sintomi che caratterizzano l'uso problematico sono i seguenti:

Tabella 8.2 I nove indicatori per dichiarare che un ragazzo faccia un uso problematico dei social media

Criteria	Sintomi
<i>Preoccupation</i>	ansia di accedere ai social
<i>Tolerance</i>	volontà di passare sempre più tempo online
<i>Withdrawal</i>	sintomi di astinenza quando offline
<i>Persistence</i>	fallimento nel controllo del tempo speso sui social
<i>Displacement</i>	trascurare altre attività quotidiane
<i>Conflict</i>	liti con genitori a causa dell'uso
<i>Problem</i>	problemi con gli altri a causa dell'uso
<i>Deception</i>	mentire ai genitori e altri sul tempo speso sui social
<i>Escape</i>	usare i social per scappare da sentimenti negativi

Per esaminare gli indicatori più importanti possiamo notare nelle figure successive come si comportano diversamente ragazzi e ragazze.


Figura 8.2 Ragazzi che dichiarano di avere fallito nel provare a passare meno tempo sui social media [PERCISTENCE] (%)



Il fallimento nel controllo del tempo speso online è un sintomo dell'uso problematico dei social media. Il grafico mostra che questo sintomo è stato riportato dal 44,5% delle ragazze e meno frequentemente dai ragazzi (28,3%).

Nelle ragazze tale sintomo aumenta con l'età (11 anni: 38,6%; 13 anni: 51% e 15 anni: 42, %) al contrario di quanto accade se si considerano i ragazzi dove rimane pressochè stabile nelle diverse età.

Figura 8.3 Ragazzi che dichiarano di avere di avere utilizzato spesso i social media per scappare da sentimento negativi [ESCAPE] (%)



Utilizzare i social media come strumento di «adattamento» (coping) per evitare le emozioni negative è un altro dei sintomi caratteristici dell'uso problematico dei social media. Il grafico mostra che questo sintomo è stato riportato complessivamente da circa il 40% delle ragazze (con percentuali maggiori nelle tredicenni e quindicenni) e da più di un quarto dei ragazzi con il valore massimo tra i 15 anni.

CONCLUSIONI

Per la prima volta nel 2018 è stato inserito il tema dei Social Media, prestando particolare attenzione al loro uso problematico.

I social sono molto utilizzati per avere contatti con la cerchia di amici stretti e familiari.

La valutazione è stata eseguita utilizzando "the Social Media Disorder Scale". I risultati mostrano che l'uso problematico è più frequente tra le ragazze di 13 anni. La preferenza tra le interazioni sociali on line rispetto agli incontri faccia a faccia è frequentemente considerato un comportamento che contribuisce al rischio di sviluppare un uso problematico dei social media. Questo comportamento è particolarmente sentito tra i 13 anni. Il 16,1% dei ragazzi e il 18,2% delle ragazze hanno dichiarato di avere contatti con amici che non conoscevano prima e contattati on-line. Anche questo comportamento sembra essere più diffuso tra i ragazzi e le ragazze dei 13 anni. Questo fenomeno va particolarmente attenzionato perché può costituire un fattore di rischio per fenomeni quali l'adescamento dei minori.

Circa il 40% delle femmine utilizza i social media per scappare da sentimenti negativi questo fenomeno è presente anche nel 25% dei ragazzi. Il fallimento del controllo del tempo speso on-line è un sintomo dell'uso problematico dei social media, il 44% delle ragazze e il 28% dei ragazzi ha dichiarato di aver fallito nel provare a passare meno tempo sui social media.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ¹Griffiths, M. D., Kuss, D. J., Billieux, J., & Pontes, H. M. (2016). The evolution of Internet addiction: A global perspective. *Addictive Behaviors*, 53, 193-195
- ²Barry, C. T., Sidoti, C. L., Briggs, S. M., Reiter, S. R., & Lindsey, R. A. (2017). Adolescent social media use and mental health from adolescent and parent perspectives. *Journal of adolescence*, 61, 1-11.
- ³Lenzi, M., Vieno, A., Altoè, G., Scacchi, L., Perkins, D.D., Zukauskienė, R., & Santinello, M. (2015). Can Facebook informational use foster adolescent civic engagement? *American Journal of Community Psychology*, 55, 444–454.
- ⁴Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2007). Preadolescents' and adolescents' online communication and their closeness to friends. *Developmental Psychology*, 43, 267-277.
- ⁵Marino, C., Gini, G., Vieno, A., & Spada M.M. (2018). The associations between problematic Facebook use, psychological distress and well-being among adolescents and young adults: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 15(226), 274-281
- ⁶Van Den Eijnden, R., Koning, I., Doornwaard, S., Van Gorp, F., & Ter Bogt, T. (2018). The impact of heavy and disordered use of games and social media on adolescents' psychological, social, and school functioning. *Journal of behavioral addictions*, 7(3), 697-706
- ⁷Marino, C., Vieno, A., Altoè, G., & Spada, M. M. (2017). Factorial validity of the Problematic Facebook Use Scale for adolescents and young adults. *Journal of Behavioral Addictions*, 6(1), 5–10.
- ⁸Caplan, S. (2010). Theory and measurement of generalized problematic Internet use: A two-step approach. *Computers in Human Behavior*, 25(5), 1089–1097.
- ⁹Van den Eijnden, R.J.J.M., Lemmens, J.S., & Valkenburg, J.M. (2016). The Social Media Disorder Scale. *Computers in Human Behavior*, 61, 478

